

SP Studio, s.r.o., architektonická kancelář,

Budějovická 58, 381 01 Český Krumlov

Tel. : 380 711 315, fax : 380 712671

E-mail : rampas@spstudio.cz

ÚZEMNÍ PLÁN

S L A V Ě

u Trhových Svinů

ODŮVODNĚNÍ

TEXTOVÁ ČÁST

SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ÚZEMNÍ PLÁN NEBO JEHO ZMĚNU VYDAL: ZASTUPITELSTVO OBCE SLAVČE		
ČÍSLO JEDNACÍ: 4/09	DATUM VYDÁNÍ: 11.12.2009	DAT. NABYTÍ ÚČINNOSTI: 30.12.2009
JMÉNO, PŘÍJMENÍ A FUNKCE OPRÁV. ÚŘEDNÍ OSOBY POŘIZOVATELE: Ing. LUDĚK KLEIN, VEDOUCÍ ÚÚP MĚÚ TRHOVÉ SVINY		
PODPIS :		OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA :

Datum : 01/2010

Číslo zakázky : SP 2008/1

Projektant :

Ing. arch. Jiří Rampas, ČKA 02603

Identifikační údaje :

Název akce :	Územní plán Slavče u Trhových Svinů
Fáze :	Upravený návrh
Objednatel :	Obec Slavče, Slavče 52, 373 21 Slavče Zodpovědný zástupce : Josef Tripes, starosta obce IČ : 245 429
Pořizovatel :	Městský úřad Trhové Sviný, Žižkovo náměstí 32 Oprávněná úřední osoba pořizovatele : Ing. Luděk Klein
Zhotovitel :	SP Studio, s.r.o., architektonická kancelář, Budějovická 58, 381 01 Český Krumlov Zodpovědný zástupce : Ing. Pavel Pecha, jednatel společnosti Osoba oprávněná zastupovat a jednat : Ing. arch. Jiří Rampas IČ : 48207977, DIČ : CZ 48207977 Zápis do OR : 13.5.1993, KS České Budějovice, oddíl C, vložka 2831
Projektant :	Ing. arch. Jiří Rampas, ČKA 02603
Zpracovatelský team :	František Kysela - zásobování elektrickou energií Václav Čutka - zásobování teplem a plynem Ing. Karel Severa – vodní hospodářství Ing. Hana Pešková – ZPF a PUPFL Jana Marková – CAD Jarmila Černá, Jana Vejvodová – administrativní činnosti

Obsah odůvodnění územního plánu Slavče :

1/ TEXTOVÁ ČÁST

- a/ Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem
- b/ Údaje o splnění zadání a pokynů pro zpracování návrhu
- c/ Komplexní zdůvodnění přijatého řešení
- d/ Informace o výsledcích vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území a o stanovisku k vyhodnocení vlivů na životní prostředí
- e/ Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF a PUPFL

2/ GRAFICKÁ ČÁST

Výkres číslo :

01	Koordinační výkres	1:5000
02	Širší vztahy	1:50 000
03	Výkres předpokládaného záboru ZPF a PUPFL	1:5000

a/ Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem

Území obce Slavče se nachází ve vymezené rozvojové ose OS 4 Praha – České Budějovice – hranice ČR (Linz). Z hlediska vymezených ploch a koridorů nevyplývají pro řešené území žádné podmínky vzhledem k tomu, že v území není lokalizován žádný koridor ani žádná plocha technické infrastruktury.

Obec Slavče se rozprostírá cca pět kilometrů jižně až jihozápadně od Trhových Svinů – nejbližší vyšší sídelní jednotky, kde se kromě úřadu obce s rozšířenou působností nachází i vyšší občanské vybavení a zdroje pracovních příležitostí.

Dominující dopravní trasou je silnice 2. třídy II/157, pro místní dopravní vztahy mají význam hlavně silnice 3. třídy III/1546 a III/14621.

Rozhodujícím přírodním fenoménem jsou Slepíčí hory s Přírodním parkem Soběnovská vrchovina, na jejichž východním úpatí se obec Slavče nachází a tvoří tak přechod k oblasti Novohradských hor.

Jednotlivé drobné sídelní jednotky s kořeny sahajícími do 13. století jsou rovnoměrně rozmístěny v antropogenní krajině, s ohledem na dosažitelnost okolních zemědělských ploch a v příznivých pěších docházkových vzdálenostech.

Platnou nadřazenou územně plánovací dokumentací je ÚP VÚC Českobudějovické sídelní regionální aglomerace, včetně změny č. 1. Z této územně plánovací dokumentace, včetně změny č. 1, nevyplývají pro řešení územního plánu Slavče žádné požadavky.

Územně plánovací dokumentace vydaná Krajem dosud neexistuje. Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje jsou rozpracovány, v současnosti je projednáván jejich návrh. V rámci regionálních a nadregionálních souvislostí, vyplývajících z této rozpracované nadřazené územně plánovací dokumentace pro územní plán Slavče, je do územního plánu zahrnut koridor technické infrastruktury – el. vzdušného vedení VN ozn. Ee 14, a to ve formě plochy územních rezerv. S dosud nepravomocným návrhem ZÚR je tedy územní plán Slavče v souladu.

b/ Údaje o splnění zadání a pokynů pro zpracování návrhu

Návrh zadání územního plánu byl projednán s dotčenými orgány, sousedními obcemi a krajským úřadem, zadání schválilo zastupitelstvo obce usnesením č. 4/2008 dne 4. 10. 2008.

Návrh územního plánu pro společné jednání byl vypracován na základě tohoto zadání a splňuje požadavky zadáním stanovené.

Řešení je invariantní, posouzení vlivů na životní prostředí nebylo požadováno.

c/ Komplexní zdůvodnění přijatého řešení

Územní plán je pro obec Slavče nástrojem pro usměrňování rozvoje území obce. Jsou stanoveny zásady věcné a časové koordinace využití území a předpoklady pro jeho udržitelný rozvoj. Základem udržitelného rozvoje je vyvážený vztah mezi podmínkami pro zachování příznivého životního prostředí, umožněním přiměřeného hospodářského rozvoje a péčí o integritu společenství obyvatel území.

Územním plánem jsou závazně vymezeny plochy územního systému ekologické stability. Segmenty ÚSES tvoří základní kostru zabezpečující fungování krajiny.

Segmenty ÚSES nacházející se v řešeném území :

k.ú. Keblany

Pořadové číslo: BC 1 (11102)	Katastrální území: Keblany
Název: Ďáblík	Mapový list 1 : 5 000 TS 9-1
<i>Ekologicky významný krajinný prvek</i> <i>Lokální biocentrum</i>	
Geobiocenologická typizace: (vegetační stupeň, trofická a hydrická řada) 3BC-4, 3BC-5	Rozloha prvku (ha): 5,10
Zpracovatel a pořadové číslo v generelovém zpracování: Gergel, BC 93	
Charakteristika současného stavu: Lokální biocentrum je vymezeno v poměrně široké nivě Keblanského potoka. Jeho základ tvoří Přírodní památka Ďáblík. Biocentrum představuje jednu z nejvýznamnějších lokalit s bohatou populací d'áblíku bahenního v jihočeském regionu. Mimo d'áblík jsou v lokalitě zastoupena vodní a mezotrofní ostřicová mokřadní společenstva s řadou dalších chráněných nebo ohrožených druhů rostlin (zábělník bahenní, vachta trojlístá, klikva žorovina). Společenstva rostlin vytváří významnou enklávu genofondu v krajině. Vlastní silně zarostlý a hospodářsky nevyužívaný „Knížecí rybník“ je napájený vodou z Keblanského potoka a z menších svahových pramenišť na jeho jižním břehu. Tůň mezi hrází rybníka a Keblanským potokem je zásobena infiltrovanou vodou pod hrází a při vyšších stavech i záplavovou vodou. Půdní poměry v lokalitě zahrnují pestrou mozaiku hydrických, subhydrických a nivních půd v různém stupni zamokření povrchovou nebo podzemní vodou. Volná hladina je zejména ve východní části rybníka, tvoří tvar podkovy se zvýšeným středem zarostlým mokřadní vegetací a náletovými dřevinami. Mezi severní hrází a tokem je silně zamokřená část s tůňmi a rovněž bohatým výskytem d'áblíku. V mokřadních společenstvech se mimo již dříve uvedené druhy dále vyskytuje suchopýr pochvatý, šišák vroubkovaný, sítina klubkatá, sítina rozkladitá, skřípina lesní, tužebník jilmový, kyprej vrbice, orobinec širokolistý, ostřice měchýřkatá, ostřice hnědá, sítina niťovitá, sítina cibulkatá, violka bahenní, hruštička jednostranná, apod. Rybník je lemován skupinovitým porostem dřevin, zejména olše lepkavé, dále vrby křehké, křovitých druhů vrb, vrby jívy, břízy bělokoré, na hrází také s dubem letním, topolem osikou, lískou obecnou. Keblanský potok je přirozeného charakteru, v široké nivě bohatě meandruje. Dno je kamenité, místy s výraznějšími nánosy jemnozrnného až štěrkopískového sedimentu, časté jsou napadávkové větvi v korytě. Rychle proudící úseky se střídají s pomalejším prouděním vody, s hlubšími tůňmi. Tok má výrazný splaveninový režim, místy dochází k břehové abrazi, včetně napadávek dřevin. V celém úseku je lemován kvalitním vzrostlým břehovým porostem, který se místy rozšiřuje v plošný porost. Zastoupena je zejména olše lepkavá, dále vrba křehká, krušina olšová, křovité druhy vrb, střemcha obecná, smrk ztepilý, topol osika, dub letní, bříza bělokorá. Niva je ohraničena převážně borovým lesem.	
Jiný způsob ochrany přírody : Přírodní památka Ďáblík, VKP - rybník, niva, tok	
Statut ochrany z jiných zájmů :	

Pořadové číslo: BC 1 (11102) - pokračování	Katastrální území: Keblany
Název: Ďáblík	Mapový list 1 : 5 000 TS 9-1
<i>Ekologicky významný krajinný prvek</i> <i>Lokální biocentrum</i>	
Geobiocenologická typizace: (vegetační stupeň, trofická a hydrická řada) 3BC-4, 3BC-5	Rozloha prvku (ha): 5,10
Zpracovatel a pořadové číslo v generelovém zpracování: Gergel, BC 93	
<u>Základní využívací podmínky a doporučení následných opatření:</u> Veškerá opatření v Přírodní památce provádět pouze v souladu s jejím plánem péče, zamezit jakýmkoliv negativním zásahům do lokality. Podél toku zachovat kvalitní břehové dřevinné porosty, ponechat je přirozenému vývoji, provádět pouze běžnou údržbu a v případě potřeby zdravotní řez. U nitrofilní vegetace provést 1 x ročně překosení, omezit její další rozšiřování. Niva toku navazující na přírodní památku je významná cennými rostlinnými společenstvy, registrována je v současné době jako VKP a je také navrženo rozšíření přírodní památky na tyto další části nivy Keblanského potoka.	
Parcelní čísla: 681/1, 687, 688/2, 689, 691, 692, 694/1, 701/1, 701/2, 701/3, 1673, 1682	

Pořadové číslo: BC 2 (11103)	Katastrální území: Keblany
Název: Pod Hájovnou	Mapový list 1 : 5 000 ČK 0-2, TS 9-2
<i>Ekologicky významný krajinný prvek</i> <i>Lokální biocentrum</i>	
Geobiocenologická typizace: (vegetační stupeň, trofická a hydrická řada) 3BC-4, 3B-4	Rozloha prvku (ha): 3,75
Zpracovatel a pořadové číslo v generelovém zpracování: Gergel, BC 92	
Charakteristika současného stavu: Lokální biocentrum je vymezeno v poměrně široké nivě Keblanského potoka v místě zaústění jeho drobného bezejmenného přítoku od obce Keblany. Niva je z obou stran ohraničena lesním porostem. Keblanský potok je přirozeného charakteru, v široké nivě bohatě meandruje. Dno je kamenité, místy s výraznějšími nánosy jemnozrnného až šterkopiskového sedimentu, časté jsou napadávký větvi v korytě. Rychle proudící úseky se střídají s pomalejším prouděním vody, s hlubšími tůňmi. Tok má výrazný splaveninový režim, místy dochází k břehové abrazi. V celém úseku je Keblanský potok lemován kvalitním vzrostlým břehovým porostem, ve kterém je zastoupena zejména olše lepkavá, vrba křehká, dále krušina olšová, křovité druhy vrb, vtroušeně stfemcha obecná, topol osika, dub letní, břiza bělokorá. Celá plocha biocentra je v současné době tvořena nevyužívanými travinobylinnými a mokřadními společenstvy rostlin na silně podmáčeném stanovišti, místy s vtroušeným skupinovitým náletem zejména olše lepkavé. V porostu jsou zastoupeny skřípina lesní, tužebník jilmový, vrbina obecná, pcháč bahenní, ostřice, sítina rozkladitá, chrastice rákosovitá, blatouch bahenní, pomněnka hajní, kostival lékařský, ojediněle s ruderalizací kopřivou dvoudomou. V nevyužívaných přirozených mokřadních loučkách s travinobylinnou a mokřadní vegetací je mapován významný biotop s častým výskytem zvláště chráněných druhů rostlin (<i>Naumburgia thyrsiflora</i> , <i>Salix x onusta</i> , <i>Calla palustris</i>). Podrobné botanické hodnocení lokality je uvedeno ve zpracovaném biotopovém mapování.	
Jiný způsob ochrany přírody : VKP - niva, tok, biotop č. 102, rVKP Ďáblík 3010024, návrh na rozšíření PP	
Statut ochrany z jiných zájmů :	
Základní využívací podmínky a doporučení následných opatření: Niva toku navazující na přírodní památku je významná cennými rostlinnými společenstvy, registrována je v současné době jako VKP a je také navrženo rozšíření přírodní památky na tyto další části nivy Keblanského potoka. Lokalitu ponechat víceméně bez zásahu přirozenému vývoji, nivu v žádném případě nezalesňovat, vyloučit veškeré činnosti negativně ovlivňující lokalitu. Travinobylinná společenstva překosit 1 x ročně, mokřadní společenstva mimo silně podmáčené plochy 1 x za 2-3 roky, omezit případnou ruderalizaci společenstev a souvislý zárust náletovými dřevinami. Nepoužívat chemické ochranné prostředky a hnojiva. Současné dřevinné porosty ponechat přirozenému vývoji, provádět pouze běžnou údržbu a v případě potřeby zdravotní řez. U hustého náletu zajistit jeho probírku, umožnit další vývoj vitálních jedinců.	
Parcelní čísla: 768/4, 769, 856, 859	

Pořadové číslo: BK 1 (12088)	Katastrální území: Kebblany
Název: Keblanský potok	Mapový list 1 : 5 000 ČK 0-1, 0-2, TS 9-1
<i>Ekologicky významné liniové společenstvo</i> <i>Lokální biokoridor</i>	
Geobiocenologická typizace: (vegetační stupeň, trofická a hydrická řada) 3B-4, 3BC-4, 3BC-5	Délka/šířka prvku (m): 1200/30-120
Zpracovatel a pořadové číslo v generelovém zpracování: Gergel 1994, BK 92-93	
Charakteristika současného stavu: Lokální biokoridor prochází v celém úseku podél severozápadních hranic řešeného území. Je představován poměrně širokou nivou Keblanského potoka s vyskytujícími se cennými rostlinnými společenstvy. Keblanský potok je přirozeného charakteru, v místy poměrně široké nivě bohatě meandruje. Dno je kamenité, místy s výraznějšími nánosy jemnozrnného až štěrkopískového sedimentu, časté jsou napadávký větvi, místy až s neprůchodností koryta. Rychle proudící úseky se střídají s pomalejším prouděním vody, s hlubšími tůněmi. Tok má výrazný splaveninový režim, místy dochází k břehové abrazi, včetně vývrátů a napadávek dřevin. V celém úseku je tok lemován kvalitním vzrostlým břehovým porostem, který se místy rozšiřuje v plošný porost. Zastoupena je zejména olše lepkavá, dále vrba křehká, krušina olšová, křovité druhy vrb, střemcha obecná, smrk ztepilý, topol osika, dub letní, bříza bělokora. Po obou stranách ve svahu dále navazuje převážně jehličnatý lesní porost, borovice, smrk. V nivě toku jsou zastoupeny drobné převážně nevyužívané přirozené mokřadní loučky s travino-bylinnou a mokřadní vegetací s častým výskytem zvláště chráněných druhů rostlin (<i>Naumburgia thyrsiflora</i>, <i>Salix x omusta</i>, <i>Calla palustris</i>). Na okraji zemědělského pozemku je vytvořeno ruderalizované společenstvo s kopřivou dvoudomou, pcháčem osetem, svízelí přitulou. Podrobné botanické hodnocení lokality je uvedeno ve zpracovaném biotopovém mapování.	
Jiný způsob ochrany přírody : VKP - les, tok, niva, biotop č. 102, rVKP, návrh rozšíření Přírodní památky Ďáblík na navazující nivu Keblanského potoka	
Statut ochrany z jiných zájmů :	
Základní využívací podmínky a doporučení následných opatření: Celou nivu Keblanského potoka ponechat přirozenému vývoji, zabránit jakýmkoliv negativním zásahům do nivy, zejména jejímu nevhodnému zalesňování. V místech, kde již byla provedena nevhodná smrková výsadba, docílit její likvidaci a obnovu původního stavu. Větší loučky překosít 1 x ročně, menší mokřadní loučky mimo silně podmačená stanoviště překosít 1 x za 2-3 roky, nepoužívat chemické ochranné prostředky a hnojiva. Pravidelně sekat zejména ruderalizované okraje nivy po okraji navazujícího zemědělského pozemku a zabránit v této části postupující ruderalizaci břehových společenstev. Břehové dřevinné porosty ponechat přirozenému vývoji, provádět pouze běžnou údržbu a v případě potřeby zdravotní řez. Niva je v současné době registrována jako významný krajinný prvek, navrženo je rozšíření Přírodní památky Ďáblík na celou tuto nivu.	
Parcelní čísla: 681/1, 701/3, 701/7, 701/9, 727, 737/1, 741, 742, 743/1, 755, 756, 767, 768/3, 856, 1681/1, 1682	

Pořadové číslo: BK 2 (12087)	Katastrální území: Kebblany
Název: Nad Traierem	Mapový list 1 : 5 000 TS 9-1
<i>Ekologicky významné liniové společenstvo</i> <i>Lokální biokoridor</i>	
Geobiocenologická typizace: (vegetační stupeň, trofická a hydrická řada) 3B-4, 3BC-4, 3BC-5	Délka/šířka prvku (m): 700/30-80
Zpracovatel a pořadové číslo v generelovém zpracování: Gergel 1994, BK 92-93	
<u>Charakteristika současného stavu:</u> Lokální biokoridor prochází v celém úseku podél severozápadních hranic řešeného území. Je představován poměrně širokou nivou Keblanského potoka s vyskytujícími se cennými rostlinnými společenstvy. Kebblanský potok je přirozeného charakteru, v místy poměrně široké nivě bohatě meandruje. Dno je kamenité, místy s výraznějšími nánosy jemnozrnného až štěrkopískového sedimentu, časté jsou napádky větví, místy až s neprůchodností koryta. Rychle proudící úseky se střídají s pomalejším prouděním vody, s hlubšími tůněmi. Tok má výrazný splaveninový režim, místy dochází k břehové abrazi, včetně vývrátů a napádek dřevin. V celém úseku je tok lemován kvalitním vzrostlým břehovým porostem, který se místy rozšiřuje v plošný porost. Zastoupena je zejména olše lepkavá, dále vrba křehká, krušina olšová, křovité druhy vrb, střemcha obecná, smrk ztepilý, topol osika, dub letní, bříza bělokorá. Části lesa zasahujícího do biokoridoru jsou na podmačeném stanovišti tvořeny převážně porostem s převahou olše, vtroušeně dubu, břízy, osiky, lípy, ve svahu dále navazuje převážně borovice, s příměsí buku, smrku, jedle, vtroušeně břízy, modřínu, lípy, dubu červeného, osiky. Zápoj plný až rozvolněný, mezernatý. Biokoridor zasahuje do lesních porostů převážně v odděleních 470 C, 534 D, 535 A. Z lesních typů převládá: LT 2L 1 - potoční luh pahorkatinný na náplavech podél potoků. V podrostu jsou zastoupeny <i>Oxalis acetosella</i>, <i>Urtica dioica</i>, <i>Stellaria holostea</i>, <i>Senecio fuchsii</i>, <i>Asarum europaeum</i>, <i>Stellaria nemorum</i>, <i>Pulmonaria officinalis</i>, <i>Aegopodium podagraria</i>, <i>Vigna brizoides</i>, <i>Deschampsia caespitosa</i>, <i>Poa nemoralis</i>. V nivě toku jsou zastoupeny drobné převážně nevyužívané přirozené mokřadní loučky s travino-bylinnou a mokřadní vegetací s cennými rostlinnými společenstvy a s častým výskytem zvláště chráněných druhů rostlin (<i>Naumburgia thyrsiflora</i>, <i>Salix x onusta</i>, <i>Calla palustris</i>). Podrobné botanické hodnocení lokality je uvedeno ve zpracovaném biotopovém mapování. V severní části se biokoridor za hranicemi řešeného území napojuje na výtopu Traierova rybníka s rozsáhlejšími litorálními porosty se zastoupením skřípice, dále zblochanu vodního, chrstice rákosovité, orobince širokolistého a skupin křovitých druhů vrb.	
Jiný způsob ochrany přírody : VKP - les, tok, niva, biotop č. 102, rVKP, návrh rozšíření Přírodní památky Ďáblík na navazující nivu Keblanského potoka	
Statut ochrany z jiných zájmů :	

Pořadové číslo: BK 2 (12087) - pokračování	Katastrální území: Keblany
Název: Nad Traierem	Mapový list 1 : 5 000 TS 9-1
<i>Ekologicky významné liniové společenstvo</i> <i>Lokální biokoridor</i>	
Geobiocenologická typizace: (vegetační stupeň, trofická a hydrická řada) 3B-4, 3BC-4, 3BC-5	Délka/šířka prvku (m): 700/30-80
Zpracovatel a pořadové číslo v generelovém zpracování: Gergel 1994, BK 92-93	
<u>Základní využívací podmínky a doporučení následných opatření:</u> Celou nivu Keblanského potoka ponechat přirozenému vývoji, zabránit jakýmkoliv negativním zásahům do nivy, zejména jejímu nevhodnému zalesňování. V místech, kde již byla provedena nevhodná smrková výsadba, docílit její likvidaci a obnovu původního stavu. Větší loučky sekat 1 x ročně, menší mokřadní loučky mimo silně podmáčená stanoviště překosít 1 x za 2-3 roky, nepoužívat chemické ochranné prostředky a hnojiva. Břehové dřevinné porosty ponechat přirozenému vývoji, provádět pouze běžnou údržbu a v případě potřeby zdravotní řez. Porosty na LPF ponechat také víceméně přirozenému vývoji, hospodaření dle LHP, postupně zajistit v nivě v trase biokoridoru redukci borovice, smrku a jejich náhradu dřevinami přirozené dřevinné skladby - olší, jasanem, dubem, jilmem a javorem. Niva je v současné době registrována jako významný krajinný prvek, navrženo je rozšíření Přírodní památky Ďáblík na celou tuto nivu.	
Parcelní čísla: 698, 700, 1682	

Pořadové číslo: BK 3 (12089)	Katastrální území: Keblany
Název: Pod hájkem	Mapový list 1 : 5 000 TS 9-1, 9-2
<i>Ekologicky významné liniové společenstvo</i> <i>Lokální biokoridor</i>	
Geobiocenologická typizace: (vegetační stupeň, trofická a hydrická řada) 4B-4, 4AB-4	Délka/šířka prvku (m): 1000/20-50
Zpracovatel a pořadové číslo v generelovém zpracování: Gergel, BK 93-97	
Charakteristika současného stavu: Lokální biokoridor prochází souběžně s východními hranicemi řešeného území podél drobné vodoteče, která představuje pravostranný přítok Keblanského potoka. Zaústíje do něho v bezprostřední blízkosti pod Přírodní památkou Dáblík. Bezejmenný tok je přirozeného charakteru, s kamenitým dnem a s výraznými nánosy jemnozrnného až štěrkopískového sedimentu, s častými napadávkami větví. Tok bohatě meandruje v poměrně úzké nivě, místy je koryto zahloubené, rychle proudící úseky se střídají s pomalým prouděním vody, s hlubšími tůňkami. Doprovázen je souvislým porostem vzrostlých dřevin, zejména olše lepkavé, který se místy rozšiřuje v plošný prvek v rámci celé nivy. Do nivy toku okrajově zasahují výběžky lesního porostu (odd. 471 A, 472 A). Niva je dále ohraničena svahem s převážně borovým lesním porostem. Podél toku se vyskytují drobné nesečené loučky a mokřadní společenstva na podmáčeném stanovišti se skřipinou lesní, tužebníkem jilmovým, ostřicemi, kypřejem vrbicí, vrbinou obecnou, od zemědělské půdy s částečnou ruderalizací kopřivou dvoudomou. V spodní části drobného pravostranného přítoku pod výběžkem orné půdy jsou v současné době vykáceny vzrostlé břehové porosty olše lepkavé, postupně se vytvářejí husté nové výmladky.	
Jiný způsob ochrany přírody : VKP - les, tok, niva	
Statut ochrany z jiných zájmů :	
Základní využívací podmínky a doporučení následných opatření: Celou nivu v biokoridoru ponechat víceméně bez zásahu přirozenému vývoji, zabránit možným negativním zásahům do nivy a břehových porostů toku, zejména nevhodnému zalesňování nebo naopak likvidaci kvalitních břehových porostů. Mokřadní loučky mimo silně podmáčená stanoviště překosit 1 x za 2-3 roky, zabránit ruderalizaci porostu a souvislému náletu dřevin, nepoužívat chemické ochranné prostředky a hnojiva. Silněji ruderalizované porosty zejména od zemědělské půdy zpočátku překosit alespoň 1 x ročně. Břehové dřevinné porosty ponechat přirozenému vývoji, provádět pouze běžnou údržbu a v případě potřeby zdravotní řez. V porostech na LPF okrajově zasahujících do nivy toku hospodaření dle LHP, postupně zajistit v nivě v trase biokoridoru redukci borovice, smrku a jejich náhradu dřevinami přirozené dřevinné skladby. V spodní části drobného pravostranného přítoku provést probírku hustých výmladků olše lepkavé, umožnit další vývoj vitálních jedinců a obnovu původních kvalitních břehových porostů. Zamezit další likvidaci těchto dřevin.	
Parcelní čísla: 663, 664, 681/1, 962/1, 1044/1	

Pořadové číslo: BK 4 (12083)	Katastrální území: Keblany
Název: Pod vsí	Mapový list 1 : 5 000 ČK 0-2, TS 9-2
<i>Ekologicky významné liniové společenstvo</i> <i>Lokální biokoridor</i>	
Geobiocenologická typizace: (vegetační stupeň, trofická a hydrická řada) 3B-4, 3BC-4	Délka/šířka prvku (m): 1300/20-110
Zpracovatel a pořadové číslo v generelovém zpracování: Gergel 1994, BK 92-115	
Charakteristika současného stavu: Lokální biokoridor prochází v celém úseku podél jihozápadních hranic řešeného území. Je představován poměrně širokou nivou Keblanského potoka, zejména v severní části s vyskytujícími se cennými rostlinnými společenstvy. Keblanský potok je přirozeného charakteru, v místy poměrně široké nivě bohatě meandruje. Dno je kamenité, místy s výraznějšími nánosy jemnozrnného až štěrkopískového sedimentu, časté jsou napadávký větví. Rychle proudící úseky se střídají s pomalejším prouděním vody, s hlubšími tůňemi. Tok má výrazný splaveninový režim, místy dochází k břehové abrazi, včetně napadávek dřevin. Tok je lemován kvalitním vzrostlým břehovým porostem, který se místy rozšiřuje v plošný porost. Zastoupena je zejména olše lepkavá, vrba křehká, dále vtroušeně krušina olšová, křovité druhy vrb, střemcha obecná, topol osika, dub letní, bříza bělokorá. Po obou stranách ve svahu dále navazuje převážně jehličnatý lesní porost s převahou smrku a borovice, s pouze vtroušenými dalšími dřevinami. Do nivy v trase biokoridoru okrajově zasahují oddělení 474 E, F, H, 539 B, 541 A. V nivě převládá LT 2L 1 - potoční luh pahorkatinný na náplavech podél potoků. V podrostu jsou zastoupeny <i>Oxalis acetosella</i>, <i>Urtica dioica</i>, <i>Stellaria holostea</i>, <i>Senecio fuchsii</i>, <i>Asarum europaeum</i>, <i>Stellaria nemorum</i>, <i>Pulmonaria officinalis</i>, <i>Aegopodium podagraria</i>, <i>Vigna brizoides</i>, <i>Deschampsia caespitosa</i>, <i>Poa nemoralis</i>. V nivě toku v jeho severní části jsou zastoupeny převážně nevyužívané přirozené mokřadní loučky s travinobylinnou a mokřadní vegetací. V porostu jsou zastoupeny skřipina lesní, tužebník jilmový, vrbina obecná, pcháč bahenní, ostřice, sítina rozkladitá, chrastice rákosovitá, blatouch bahenní, pomněnka hajní, kostival lékařský, ojediněle s ruderalizací kopřivou dvoudomou. V nevyužívaných přirozených mokřadních loučkách v severní části biokoridoru přibližně v úseku pod zaústěním Besednického potoka je mapován významný biotop s častým výskytem zvláště chráněných druhů rostlin (<i>Naumburgia thyrsiflora</i>, <i>Salix x onusta</i>, <i>Calla palustris</i>). Podrobné botanické hodnocení lokality je uvedeno ve zpracovaném biotopovém mapování. V jižní části na nivě navazují na pravém břehu jednotlivé chaty.	
Jiný způsob ochrany přírody : VKP - les, tok, niva, biotop č. 102, rVKP, návrh rozšíření Přírodní památky Ďáblík na navazující nivu Keblanského potoka	
Statut ochrany z jiných zájmů :	

Pořadové číslo: BK 4 (12083) - pokračování	Katastrální území: Keblany
Název: Pod vsí	Mapový list 1 : 5 000 ČK 0-2, TS 9-2
<i>Ekologicky významné liniové společenstvo</i> <i>Lokální biokoridor</i>	
Geobiocenologická typizace: (vegetační stupeň, trofická a hydrická řada) 3B-4, 3BC-4	Délka/šířka prvku (m): 1300/20-110
Zpracovatel a pořadové číslo v generelovém zpracování: Gergel 1994, BK 92-115	
<u>Základní využívací podmínky a doporučení následných opatření:</u> Celou nivu Keblanského potoka ponechat víceméně přirozenému vývoji, zabránit veškerým negativním zásahům do nivy, zejména jejímu nevhodnému zalesňování. V místech, kde již byla případně provedena nevhodná smrková výsadba, docílit její likvidaci a obnovu původního stavu. Nerozšiřovat dále jakoukoliv chatovou zástavbu navazující na nivu toku. Větší loučky překosit 1 x ročně, menší mokřadní loučky mimo silně podmáčená stanoviště překosit 1 x za 2-3 roky, nepoužívat chemické ochranné prostředky a hnojiva. Břehové dřevinné porosty ponechat přirozenému vývoji, provádět pouze běžnou údržbu a v případě potřeby zdravotní řez. V porostech na LPF hospodaření dle LHP, postupně zajistit v nivě toku v trase biokoridoru redukci borovice, smrku a jejich náhradu dřevinami přirozené dřevinné skladby - olší, jasanem, dubem, jilmem a javorem. Níva je v současné době registrována jako významný krajinný prvek, navrženo je rozšíření Přírodní památky Dáblík na celou tuto nivu, přibližně až po zaústění Besednického potoka.	
Parcelní čísla: 860, 861, 868, 869/1, 869/2, 870, 871, 872, 876/1, 1181/4, 1181/5, 1181/6, 1209/1, 1219/1, 1231/1, 1235, 1236, 1666/2, 1680, 1681/2	

k.ú. Mohuřice:

Pořadové číslo: BC 1 (11104)	Katastrální území: Mohuřice
Název: U zákrutů	Mapový list 1 : 5 000 TS 9-2
<i>Ekologicky významný krajinný prvek</i> <i>Lokální biocentrum</i>	
Geobiocenologická typizace: (vegetační stupeň, trofická a hydrická řada) 4B-4, 4BC-4, 4A-4, 4A-3	Rozloha prvku (ha): 6,50
Zpracovatel a pořadové číslo v generelovém zpracování: Gergel, BC 115	
Charakteristika současného stavu: Lokální biocentrum je umístěno převážně na pravém břehu Keblanského potoka nad komunikací Trhové Sviny - Besednice. Zaujímá nivu toku s břehovými společenstvy a navazující lesní porost ve svahu mezi Keblanským potokem a jeho drobným pravostranným přítokem. Biocentrum je tvořeno kulturními lesními porosty, tvořenými mozaikou různověkových skupin s převahou borovice, s příměsí smrku, v mladých skupinách ojediněle vtroušená jedle. Zápoj je v mladých skupinách plný, ve starších mírně rozvolněný až rozvolněný, místy mezernatý. Oddělení, porost: 493A. Převažují LT: LT 4K6 - kyselá bučina borůvková na hřebtech a horních částech svahů, 4Q6 - chudá dubová jedlina borůvková s rašeliníkem na plošinách Pedologie: podzolovaná oligotrofní hnědá půda, surový moder, surový humus, velmi silně kyselá, skeletovitá, středně hluboká, mírně vlhká (LT 4K6), na vlhkém stanovišti podzolovaný pseudoglej až výrazný pseudoglej, typický surový humus, silně kyselá půda, pH, dospodu až pjh, se slepenci, na terciéru i valouny, střídavě zamokřená, drobná, dospod soudržná až vazká (LT 4Q6). Fytocenologie: lesní porosty na stanovištích kyselých bučin sv. Luzulo-Fagion a jedlových doubrav sv. Genisto germanicae-Quercion, maloplošně kulturních borů sv. Dicrano-Pinion, pod vyspělými porosty převažují druhy <i>Luzula luzuloides</i>, <i>Avenella flexuosa</i>, <i>Vaccinium myrtillus</i>, <i>Hieracium murorum</i>, <i>Melampyrum pratense</i>, <i>Pleurozium schreberi</i>, <i>Dicranum scoparium</i>, <i>Hylocomium splendens</i>, <i>Leucobryum glaucum</i>, na vlhčím stanovišti přistupují <i>Rhodococcum vitis idaea</i>, <i>Molinia arundinacea</i>, <i>Calamagrostis villosa</i>, <i>Dicranum polysetum</i>, <i>Polytrichum formosum</i>, <i>Sphagnum sp.</i> Součástí biocentra je také niva Keblanského potoka s vyvinutými břehovými společenstvy. Keblanský potok je přirozeného charakteru, v místy poměrně široké nivě bohatě meandruje. Dno je kamenité, místy s výraznějšími nánosy jemnozrnného až štěrkopískového sedimentu, časté jsou napadávký větvi. Rychle proudící úseky se střídají s pomalejším prouděním vody, s hlubšími tůňkami. Tok má výrazný splaveninový režim, místy dochází k břehové abrazi. V celém úseku je tok lemován kvalitním vzrostlým břehovým porostem, který se místy rozšiřuje v plošný porost. Zastoupena je zejména olše lepkavá, dále vrba křehká, krušina olšová, křovité druhy vrb, střemcha obecná, bříza bělokorá. V podrostu na silně podmačeném stanovišti dominuje chřastice rákosovitá, místy je zastoupena skřípina lesní, vrbina obecná, kostival lékařský, kopřiva dvoudomá.	

Poradové číslo: BC 1 (11104) - pokračování	Katastrální území: Mohuňce
Název: U zákrutů	Mapový list 1 : 5 000 TS 9-2
<i>Ekologicky významný krajinný prvek</i> <i>Lokální biocentrum</i>	
Geobiocenologická typizace: (vegetační stupeň, trofická a hydrická řada) 4B-4, 4BC-4, 4A-4, 4A-3	Rozloha prvku (ha): 6,50
Zpracovatel a pořadové číslo v generelovém zpracování: Gergel, BC 115	
Jiný způsob ochrany přírody : VKP - les, niva, tok	
Statut ochrany z jiných zájmů :	
<u>Základní využívací podmínky a doporučení následných opatření:</u> V současnosti nevyhovující dřevinná skladba, bez zastoupení dřevin přirozené skladby. V předmyšlných porostech hospodaření dle LHP, při obnově včas do porostů zavést dostatečný podíl jedle, dubu a buku, jako vtroušenou dřevinu zavést lípu. Obnovovat především clonnými sečemi kombinovanými s maloplošnými předsunutými prvky pro buk, jedli a dub. Kvalitní borovice ponechávat jako výstavky zarůst do mlazin. Břízu nalétlou na obnovované plochy ponechat jako meliorační dřevinu v porostech až do jejího fyzického věku. Podíl borovice a smrku výhledově (2-3 obmýtí) snížit na 40-50%. <i>Přirozená dřevinná skladba:</i> 4K - jd 1-2, bo 0-+, bk 5-7, db +-3, lp +-1, bř 0-+, 4Q - db 3-4, bk 1-2, jd 3-4, sm 0-+, bo 0-2, bř, os + V nivě toku víceméně bez zásahu, lokalitu ponechat přirozenému vývoji, u dřevin provádět pouze běžnou údržbu a v případě potřeby zdravotní řez.	
Parcelní čísla: 112	

Pořadové číslo: BC 2 (11117)	Katastrální území: Mohuňce
Název: Pod Lništěm	Mapový list 1 : 5 000 TS 9-1
<i>Ekologicky významný krajinný prvek</i> <i>Lokální biocentrum</i>	
Geobiocenologická typizace: (vegetační stupeň, trofická a hydrická řada) 4B-4, 4BC-4	Rozloha prvku (ha): 3,90
Zpracovatel a pořadové číslo v generelovém zpracování: Gergel, BC 97	
Charakteristika současného stavu:	
Lokální biocentrum je vymezeno pod obcí Lniště na drobné vodoteči, která představuje levostranný přítok Klenského potoka. Je tvořeno malým rybníkem a navazujícími břehovými a doprovodnými společenstvy podél toku. Rybník je po celém obvodu lemován vzrostlými dřevinami, olší lepkavou, dále břízou bělokorou, vrbou jívou, dubem letním, borovicí lesní, křovitými druhy vrb, jeřábem obecným, krušinou olšovou, dále ve výtopě pokračuje v krátkém úseku na podmáčeném stanovišti dřevinný porost obdobného druhového složení. Vytvořeny jsou místní fragmenty litorálních porostů, orobince širokolistého, zblochanu vzplývavého, chrastice rákosovité, ostřice, sítiny rozkladité, skřípiny lesní. Pod hrází se na silně podmáčeném stanovišti vytvořilo mokřadní společenstvo se skřípinou lesní, ostřicemi, sítinou rozkladitou, dále podél vodoteče pokračuje v podmáčené nivě poměrně široký pás převážně vzrostlé olše lepkavé, místy s břízou, dubem, krušinou olšovou, v podrostu s tužebníkem jilmovým, blatouchem, skřípinou, s výrazným jarním aspektem sasanek a orseje. Na levém břehu rybníka dále pokračuje využívaný, zčásti nevyužívaný luční porost s pestrým druhovým složením. Nad rybníkem nad porostem dřevin navazuje poměrně rozsáhlé nevyužívané mokřadní společenstvo se skřípinou, pcháčem bahenním, vrbinou obecnou, sítinou rozkladitou, sítinou klubkatou, ostřicemi, karbincem evropským, bezkolencem, tužebníkem jilmovým, orobincem širokolistým. V horní části toto mokřadní společenstvo pokračuje do plochy s vyvinutým porostem převážně křovitých druhů vrb a krušiny olšové, místně s náletem břízy a borovice. Na pravé straně biocentra navazuje maloplošný převážně borový lesík, místy s dubem, břízou, v podrostu s krušinou. Na levé straně se nachází erozně náchylná orná půda.	
Jiný způsob ochrany přírody : VKP - rybník, tok	
Statut ochrany z jiných zájmů :	
Základní využívací podmínky a doporučení následných opatření:	
Celou lokalitu ponechat víceméně přirozenému vývoji, u břehových a doprovodných dřevinných porostů provádět pouze běžnou údržbu a v případě potřeby zdravotní řez. Olšinu pod rybníkem ponechat také víceméně bez zásahu, pouze v případě potřeby zdravotní výběr.	

Pořadové číslo: BC 2 (11117) - pokračování	Katastrální území: Mohuřice
Název: Pod Lništěm	Mapový list 1 : 5 000 TS 9-1
<i>Ekologicky významný krajinný prvek</i> <i>Lokální biocentrum</i>	
Geobiocenologická typizace: (vegetační stupeň, trofická a hydrická řada) 4B-4, 4BC-4	Rozloha prvku (ha): 3,90
Zpracovatel a pořadové číslo v generelovém zpracování: Gergel, BC 97	
V horní části biocentra na levé straně zatravnit na okraji erozně náchylné orné půdy ochranný pás o minimální šířce 10 m. Luční porosty včetně ruderalizovaných okrajů břehových společenstev je nutné pravidelně 1-2 x ročně sekat, nezvyšovat intenzitu jejich využívání, nepoužívat chemické ochranné prostředky a hnojiva. Mokřadní společenstva mimo silně podmáčené plochy překosit 1 x za 2-3 roky, zabránit jejich případné ruderalizaci. Při případné budoucí nutné těžbě sedimentu z rybníku omezit veškeré negativní zásahy do břehových a litorálních společenstev, vytěžený materiál neukládat v blízkosti biocentra, ale na základě rozborů zdravotní nezávadnosti ho využít na zemědělské pozemky v povodí (resp. nejprve ke kompostování), nebo využít jiným určeným způsobem.	
Parcelní čísla:	
457, 458, 468/1, 468/2, 468/7, 468/8, 1887/1, 1888, 1889, 1895, 1896/1, 1898/1, 1900, 1901, 1912/1, 1912/2	

Pořadové číslo: RBK 1 / RK 64 (22042)	Katastrální území: Mohuřice
Název: Pod Strání	Mapový list 1 : 5 000 TS 8-1
<i>Ekologicky významný krajinný prvek Regionální biokoridor</i>	
Geobiocenologická typizace: (vegetační stupeň, trofická a hydrická řada) 3B-4, 3BC-4	Délka/šířka prvku (m): 1000/50
Zpracovatel a pořadové číslo v generelovém zpracování: Gergel, BK 96-97	
Charakteristika současného stavu: Regionální biokoridor propojuje povodí Svinenského potoka jižně podél intravilánu obce Trhové Sviny. Klenský potok je v spodním úseku pod komunikací Trhové Sviny - Něchov opevněn do dna i boku kamenem, s rychle proudící vodou, bez výrazných známek přirozené revitalizace. Doprovázen je převážně pásem chřastice rákosovité a kopřivy dvoudomé, s vyvinutým dřevinovým doprovodem olše lepkavé, břízy bělokoré, vrby křehké, dubu letního, střemchy obecné, lípy malolisté. Nad silnicí je tok upraven, revitalizován a zpevněn kamenným pohozem (údaje o sledování stavu toku po revitalizačních úpravách jsou uloženy u VÚMOP Praha). Dno je částečně překryto vrstvou hrubšího štěrkovitého materiálu, v korytě se vyskytují nárosty hvězdoše. Tok je doprovázen pásem chřastice, kopřiv, tužebníku a vzrostlým doprovodem převážně olše lepkavé. V části nad Buškovým hamrem tok již získává opět přirozený charakter, místně je opevněna kamenem do břehu od souběžně vedeného náhonu. Dno je kamenité, místy s výraznými nároty jemnozrnného až štěrkopískového sedimentu, objevují se známky břehové abraze. Úseky rychlého proudění vody se střídají s pomalejším prouděním, místy se vytváří i hlubší tůň. Tok je doprovázen vyvinutým porostem vzrostlých dřevin, olše lepkavé, břízy bělokoré, jeřábu obecného, střemchy obecné, vrby jívy, dubu letního, lísky obecné. Po levé straně navazuje orná půda. Zčásti biokoridor zasahuje v nivě do lesních porostů, převážně odd. 468 A, B. Převažuje LT: 3L 1 - olšová jasanina potoční na naplaveninách. V podrostu jsou zastoupeny <i>Oxalis acetosella</i>, <i>Urtica dioica</i>, <i>Stellaria holostea</i>, <i>Senecio fuchsii</i>, <i>Asarum europaeum</i>, <i>Stellaria nemorum</i>, <i>Pulmonaria officinalis</i>, <i>Aegopodium podagraria</i>, <i>Vigna brizoides</i>, <i>Deschampsia caespitosa</i>, <i>Poa nemoralis</i>. V korytě souběžně procházejícího náhonu se vytváří místy výrazné nároty jemnozrnného sedimentu, místně vystupují až nad hladinu vody. Nad rozdělovacím objektem je tok přirozeného charakteru, meandruje, doprovázen je podél koryta vzrostlým porostem převážně olše lepkavé, dále vrby křehké, střemchy, břízy, po okraji s vytvořeným porostem chřastice rákosovité, kopřivy, dále navazují lesní porosty.	
Jiný způsob ochrany přírody : VKP - les, tok, niva	
Statut ochrany z jiných zájmů :	
Základní využívací podmínky a doporučení následných opatření: Břehové porosty podél toku ponechat přirozenému vývoji, provádět pouze běžnou údržbu a v případě potřeby zdravotní řez.	

Pořadové číslo: RBK 1 (22042) – pokračování	Katastrální území: Mohuřice
Název: Pod Strání	Mapový list 1 : 5 000 TS 8-1
<i>Ekologicky významný krajinný prvek Regionální biokoridor</i>	
Geobiocenologická typizace: (vegetační stupeň, trofická a hydrická řada) 3B-4, 3BC-4	Délka/šířka prvku (m): 1000/50
Zpracovatel a pořadové číslo v generelovém zpracování: Gergel, BK 96-97	
Zachovat přirozený charakter toku, mimo úseku podél komunikace neprovádět žádné další technické úpravy koryta. Udržovat náhon k hamru. V porostech na LPF hospodaření dle LHP, postupně zajistit v nivě toku v trase biokoridoru redukci nevhodných dřevin a jejich náhradu dřevinami přirozené dřevinné skladby (zejména olší, jasanem), vytvořit věkově a prostorově diferencovaný porost s bohatou vnitřní strukturou obhospodařovaný pouze jemnějšími obnovními způsoby, s dřevinnou skladbou blízkou přirozené, trvale zachovat listnaté břehové porosty. Přirozená dřevinná skladba: 3L - ol 7, js 3, sm (těp, os). V úseku nad hamrem bude po levé straně toku vytvořen minimálně 20 m široký ochranný pás trvalého travního porostu na okraji orné půdy. Luční porost včetně ruderalizovaných okrajů břehových společenstev bude sečen pravidelně 1-2 x ročně, nebudou používány chemické ochranné prostředky a hnojiva.	
Parcelní čísla:	
1933, 1935, 1937, 1938, 1939, 1981, 1983, 1984, 1985, 1991, 1992/1, 1992/2, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011/1, 2011/2, 2012, 2013/1, 2013/2, 2014, 2050, 2052, 2065, 2066, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2078, 2079	

Poradové číslo: BK 2 (12087)	Katastrální území: Mohuřice
Název: Nad Traierem	Mapový list 1 : 5 000 TS 9-1
<i>Ekologicky významné liniové společenstvo</i> <i>Lokální biokoridor</i>	
Geobiocenologická typizace: (vegetační stupeň, trofická a hydrická řada) 3B-4, 3BC-4, 3BC-5	Délka/šířka prvku (m): 700/30-80
Zpracovatel a poradové číslo v generelovém zpracování: Gergel 1994, BK 92-93	
Charakteristika současného stavu: Lokální biokoridor prochází v celém úseku podél severozápadních hranic řešeného území. Je představován poměrně širokou nivou Keblanského potoka s vyskytujícími se cennými rostlinnými společenstvy. Keblanský potok je přirozeného charakteru, v místy poměrně široké nivě bohatě meandruje. Dno je kamenité, místy s výraznějšími nánosy jemnozrnného až štěrkopískového sedimentu, časté jsou napádky větvi, místy až s neprůchodností koryta. Rychle proudící úseky se střídají s pomalejším prouděním vody, s hlubšími tůňemi. Tok má výrazný splaveninový režim, místy dochází k břehové abrazi, včetně vývrátů a napádek dřevin. V celém úseku je tok lemován kvalitním vzrostlým břehovým porostem, který se místy rozšiřuje v plošný porost. Zastoupena je zejména olše lepkavá, dále vrba křehká, krušina olšová, křovité druhy vrb, stěmcha obecná, smrk ztepilý, topol osika, dub letní, bříza bělokorá. Části lesa zasahujícího do biokoridoru jsou na podmáčeném stanovišti tvořeny převážně porostem s převahou olše, vtroušené dubu, břízy, osiky, lípy, ve svahu dále navazuje převážně borovice, s příměsí buku, smrku, jedle, vtroušené břízy, modřinu, lípy, dubu červeného, osiky. Zápoj plný až rozvolněný, mezernatý. Biokoridor zasahuje do lesních porostů převážně v odděleních 470 C, 534 D, 535 A. Z lesních typů převládá: LT 2L 1 - potoční luh pahorkatinný na náplavech podél potoků. V podrostu jsou zastoupeny <i>Oxalis acetosella</i>, <i>Urtica dioica</i>, <i>Stellaria holostea</i>, <i>Senecio fuchsii</i>, <i>Asarum europaeum</i>, <i>Stellaria nemorum</i>, <i>Pulmonaria officinalis</i>, <i>Aegopodium podagraria</i>, <i>Vigna brizoides</i>, <i>Deschampsia caespitosa</i>, <i>Poa nemoralis</i>. V nivě toku jsou zastoupeny drobné převážně nevyužívané přirozené mokřadní loučky s travino-bylinnou a mokřadní vegetací s cennými rostlinnými společenstvy a s častým výskytem zvláště chráněných druhů rostlin (<i>Naumburgia thyrsiflora</i>, <i>Salix x onusta</i>, <i>Calla palustris</i>). Podrobné botanické hodnocení lokality je uvedeno ve zpracovaném biotopovém mapování. V severní části se biokoridor za hranicemi řešeného území napojuje na výtoku Traierova rybníka s rozsáhlejšími litorálními porosty se zastoupením skřipince, dále zblochanu vodního, chrastice rákosovité, orobince širokolistého a skupin křovitých druhů vrb.	
Jiný způsob ochrany přírody :	VKP - les, tok, niva, biotop č. 102, rVKP, návrh rozšíření Přírodní památky Ďáblík na navazující nivu Keblanského potoka
Statut ochrany z jiných zájmů :	

Poradové číslo: BK 2 (12087) - pokračování	Katastrální území: Mohuňice
Název: Nad Traierem	Mapový list 1 : 5 000 TS 9-1
<i>Ekologicky významné liniové společenstvo</i> <i>Lokální biokoridor</i>	
Geobiocenologická typizace: (vegetační stupeň, trofická a hydrická řada) 3B-4, 3BC-4, 3BC-5	Délka/šířka prvku (m): 700/30-80
Zpracovatel a pořadové číslo v generelovém zpracování: Gergel 1994, BK 92-93	
<u>Základní využívací podmínky a doporučení následných opatření:</u> Celou nivu Keblanského potoka ponechat přirozenému vývoji, zabránit jakýmkoliv negativním zásahům do nivy, zejména jejímu nevhodnému zalesňování. V místech, kde již byla případně provedena nevhodná smrková výsadba, docílit její likvidaci a obnovu původního stavu. Větší loučky sekat 1 x ročně, menší mokřadní loučky mimo silně podmáčená stanoviště překosit 1 x za 2-3 roky, nepoužívat chemické ochranné prostředky a hnojiva. Břehové dřevinné porosty ponechat přirozenému vývoji, provádět pouze běžnou údržbu a v případě potřeby zdravotní řez. Porosty na LPF ponechat také víceméně přirozenému vývoji, hospodaření dle LHP, postupně zajistit v nivě v trase biokoridoru redukci borovice, smrku a jejich náhradu dřevinami přirozené dřevinné skladby - olší, jasanem, dubem, jilmem a javorem. Niva je v současné době registrována jako významný krajinný prvek, navrženo je rozšíření Přírodní památky Ďáblík na celou tuto nivu.	
Parcelní čísla: 698, 1316, 1317, 1318, 1319, 1696, 1730/4, 1732, 1744, 1746, 1748, 1827, 1828, 2086	

Poradové číslo: BK 3 (12089)	Katastrální území: Mohuřice
Název: Pod hájkem	Mapový list 1 : 5 000 TS 9-1, 9-2
<i>Ekologicky významné liniové společenstvo</i> <i>Lokální biokoridor</i>	
Geobiocenologická typizace: (vegetační stupeň, trofická a hydrická řada) 4B-4, 4AB-4, 4AB-3	Délka/šířka prvku (m): 2100/20-50
Zpracovatel a pořadové číslo v generelovém zpracování: Gergel, BK 93-97	
Charakteristika současného stavu: Lokální biokoridor prochází zpočátku souběžně se západními hranicemi řešeného území podél drobné vodoteče, která představuje pravostranný přítok Keblanského potoka. Zaústíje do něho v bezprostřední blízkosti pod Přírodní památkou Dáblík. Dále propojuje jednotlivé drobné lesíky, remízy a luční porosty k bezejmennému přítoku Klenského potoka. Bezejmenný tok v západní části biokoridoru je přirozeného charakteru, s kamenitým dnem a s výraznými nánosy jemnozrnného až štěrkopískového sedimentu, s častými napadávkami větví. Tok bohatě meandruje v poměrně úzké nivě, místy je koryto zahloubené, rychle proudící úseky se střídají s pomalým prouděním vody, s hlubšími tůňkami. Je doprovázen souvislým porostem vzrostlých dřevin, zejména olše lepkavé, který se místy rozšiřuje v plošný prvek v ploše celé nivy. Do nivy toku okrajově zasahují výběžky lesního porostu (odd. 471 A, B, 472 A, 473 B). Níva je dále ohraničena svahem s převážně borovým lesním porostem. Podél toku se vyskytují drobné nesečené loučky a mokřadní společenstva na podmáčeném stanovišti se skřipinou lesní, tužebníkem jilmovým, ostřicemi, kyprejem vrbicí, vrbinou obecnou, od zemědělské půdy s částečnou ruderalizací kopřivou dvoudomou. V spodní části drobného pravostranného přítoku pod výběžkem orné půdy jsou v současné době vykáceny vzrostlé břehové porosty olše lepkavé, postupně se vytvářejí husté nové výmladky. Ve východní části biokoridor propojuje využívané luční porosty, břehové porosty drobné vodoteče a rybníčku a jednotlivé drobné lesíky v zemědělské krajině. V krátkých úsecích prochází po orné půdě. V lesích převažuje borovice, místy s výraznějším zastoupením břízy (odd. 468 E, F, převažuje LT 4K 1 kyselá bučina metlicová na plochých vyvýšeninách a mírných svazích, 4K 6 - kyselá bučina borůvková na hřbetech a horních částech svahů). Mezi lesíky prochází biokoridor po mezi na rozhraní lučních porostů a orné půdy. Mez je v současné době téměř bez dřevin, pouze s ojedinělým náletem borovice. V krátkém úseku je biokoridor tvořen také souvislým porostem vzrostlých dřevin podél drobné vodoteče a rybníčku. Zastoupena je zejména bříza bělokorá, dále olše lepkavá, jasan ztepilý, lípa malolistá, vrba křehká, křovité druhy vrb.	
Jiný způsob ochrany přírody : VKP - les, tok, níva	
Statut ochrany z jiných zájmů :	
Základní využívací podmínky a doporučení následných opatření: Celou nivu v biokoridoru ponechat víceméně bez zásahu přirozenému vývoji, zabránit možným negativním zásahům do nivy a břehových porostů toku, zejména nevhodnému zalesňování nebo	

Poradové číslo: BK 3 (12089) - pokračování	Katastrální území: Mohuřice
Název: Pod hájkem	Mapový list 1 : 5 000 TS 9-1, 9-2
<i>Ekologicky významné liniové společenstvo</i> <i>Lokální biokoridor</i>	
Geobiocenologická typizace: (vegetační stupeň, trofická a hydrická řada) 4B-4, 4AB-4, 4AB-3	Délka/šířka prvku (m): 2100/20-50
Zpracovatel a pořadové číslo v generelovém zpracování: Gergel, BK 93-97	
naopak likvidaci kvalitních břehových porostů. Mokřadní loučky mimo silně podmačená stanoviště překosit 1 x za 2-3 roky, zabránit ruderalizaci porostu a souvislému náletu dřevin, nepoužívat chemické ochranné prostředky a hnojiva. Silněji ruderalizované porosty zejména v částech od zemědělské půdy zpočátku překosit alespoň 1 x ročně. Břehové dřevinné porosty ponechat přirozenému vývoji, provádět pouze běžnou údržbu a v případě potřeby zdravotní řez. V porostech na LPF okrajově zasahujících do nivy toku hospodaření dle LHP, postupně zajistit v nivě v trase biokoridoru redukcí borovice, smrku a jejich náhradu dřevinami přirozené dřevinné skladby. Také v jednotlivých drobných lesích hospodaření dle LHP, při obnově zejména v lesním plášti zajistit vysoké zastoupení dřevin dle přirozené dřevinné skladby (zejména buk, jedle, dub). V spodní části drobného pravostranného přítoku provést probírku hustých výmladků olše lepkavé, umožnit další vývoj vitálních jedinců a obnovu původních kvalitních břehových porostů. Zamezit další likvidaci těchto dřevin. V trase biokoridoru v krátkých úsecích po orné půdě provést zatrávnění v pásu o minimální šířce 20 m, luční porosty pravidelně 1-2 x ročně sekat, nepoužívat chemické ochranné prostředky a hnojiva. V trase biokoridoru, zejména podél polní cesty a na mezi, je navržena výsadba vhodných dřevin skupinovitého charakteru, která doplní chybějící volnou zeleň v krajině. Cílem je vytvořit kvalitní porost s bohatou vnitřní strukturou a vertikálním členěním.	
Parcelní čísla: 468/1, 468/5, 468/6, 469/2, 470, 472/1, 504, 546, 546/6, 549/2, 549/3, 549/7, 564, 565, 570, 587, 589, 590, 620, 623/1, 636, 637, 1828, 1830, 1831, 1846, 1848, 1854, 1855, 1884, 1885/1, 1885/3	

Poradové číslo: BK 4 (12248)	Katastrální území: Mohuřice
Název: Ke Lništi	Mapový list 1 : 5 000 TS 8-1, 9-1
<i>Ekologicky významné liniové společenstvo</i> <i>Lokální biokoridor</i>	
Geobiocenologická typizace: (vegetační stupeň, trofická a hydrická řada) 3B-4, 3BC-4, 3BC-5	Délka/šířka prvku (m): 500/20-30
Zpracovatel a pořadové číslo v generelovém zpracování: Gergel, BK 96-97	
<u>Charakteristika současného stavu:</u> Biokoridor prochází řešeným územím v úseku mezi Klenským potokem a biocentrem Pod Lništěm. V celém úseku je představován břehovými a doprovodnými porosty podél drobné bezjmenné vodoteče vytvářející levostranný přítok Klenského potoka. Tok je přirozeného charakteru, s hlinitými břehy, bohatě meandruje. Místy se vytváří nánosy jemnozrnného až písčitého sedimentu, organické hmoty, časté jsou napadávký větví a dřevin v korytě, které způsobují tvorbu přirozených jízdek a přepadů vody. Tok je na silně podmaččeném stanovišti lemován poměrně širokým pásek vzrostlých dřevin, zejména olše lepkavé. Vtroušeně je dále zastoupena bříza bělokorá, střemcha obecná, krušina olšová, jasan ztepilý, křovité druhy vrb, topol osika. Na pravé straně navazuje převážně borový les. V podrostu se vyskytuje mokřadní společenstvo s tužebníkem jilmovým, skřípinou lesní, tuřící třeslicovitou, blatouchem bahenním, výrazný je jarní aspekt sasaneč a orseje. V spodní části nad Klenským potokem biokoridor zčásti zasahuje podél toku do lesního porostu, odd. 468 B, C. Převažuje LT 3L 1 - olšová jasanina potoční na naplaveninách. Pod silnicí na levé straně ve svahu na tok navazuje pod zemědělskou půdou poměrně široký pás nitrofilní vegetace s kopřivou dvoudomou, svízelem, maliníkem.	
Jiný způsob ochrany přírody : VKP - les, tok, niva	
Statut ochrany z jiných zájmů :	
<u>Základní využívací podmínky a doporučení následných opatření:</u> Porosty olše podél toku ponechat víceméně bez zásahu, provádět pouze běžnou údržbu a v případě potřeby zdravotní výběr. V lesním porostu hospodaření dle LHP, vytvořit a trvale zachovat věkově a prostorově diferencovaný porost s bohatou vnitřní strukturou obhospodařovaný pouze jemnějšími obnovními způsoby, s dřevinnou skladbou blízkou přirozené dle jednotlivých lesních typů. Přirozená dřevinná skladba: 3L - ol 7, js 3, sm (tpč, os). V úseku pod silnicí zajistit ve svahu na levé straně toku pravidelné sečení rozsáhlé nitrofilní vegetace, zpočátku minimálně 2 x ročně, postupně převést na porost s pestřejší druhovou skladbou. Navazující luční porosty na levé straně biokoridoru pravidelně 1-2 x ročně sekat, nepoužívat chemické ochranné prostředky a hnojiva.	
Parcelní čísla: 1912/1, 1920, 1922, 1939	

Pořadové číslo: BK 5 (12100)	Katastrální území: Mohuňce
Název: K Slavči	Mapový list 1 : 5 000 TS 9-2, 9-3
<i>Ekologicky významné liniové společenstvo</i> <i>Lokální biokoridor</i>	
Geobiocenologická typizace: (vegetační stupeň, trofická a hydrická řada) 4B-4, 4B-3, 4BC-4	Délka/šířka prvku (m): 1900/20-30
Zpracovatel a pořadové číslo v generelovém zpracování: Gergel, BK 115-120	
Charakteristika současného stavu: Lokální biokoridor propojuje povodí Keblanského a Klenského potoka mělkou terénní depresí, z větší části podél drobných bezejmenných vodotečí. V západní části biokoridor prochází v krátkém úseku nad Keblanským potokem podél drobné vodoteče lesním porostem. Les je převážně borový, s příměsí smrku, vtroušeně břízy, jeřábu, dubu, buku (odd. 492 D). Vodoteč protéká v zařízlém korytě, po obou stranách ohraničena svahy s lesním porostem. Na prosvětlených úsecích je doprovázena vzrostlým porostem olše lepkavé, dále břízy bělokoré, střemchy obecné, krušiny olšové. Udrží si přirozený charakter, dno je kamenité, místy s nánosy jemnozrnného až písčitého sedimentu. Rychle proudící úseky se střídají s pomalejším prouděním, místy i s hlubšími tůňkami. Místy, zejména ve spodním úseku, i výrazněji meandruje. Nad lesním porostem biokoridor prochází po jeho okraji na jetelotravním porostu a přechází komunikaci, která je lemována mezerovitou linií ovocných dřevin, jabloně, hrušně, vtroušeně s dubem, třešní, břízou, slivoní švestkou, bezem černým. Podél komunikace je tvořen ornou půdou. Pod silnicí se biokoridor napojuje na úzký pás využívaného lučního porostu a dále na drobnou vodoteč tvořící levostranný přítok Klenského potoka. Vodoteč je doprovázena souvislým porostem vzrostlých dřevin, olše lepkavé, dále vrby křehké, břízy bělokoré, topolu osiky, bezu černého. V spodní části se vodoteč napojuje na lesní porost (odd. 491 C), převážně borový, místy se zastoupením smrku, buku, po okraji podél vodoteče s místy poměrně širokým pásem olše lepkavé, dále s dubem, břízou, třešní, osikou, střemchou, krušinou. Na pravé straně vodoteče navazuje erozně velmi náchylný pozemek orné půdy. Podél koryta je vytvořen poměrně široký pás nitrofilní vegetace s dominantní kopřivou dvoudomou.	
Jiný způsob ochrany přírody : VKP - les, tok	
Statut ochrany z jiných zájmů :	
Základní využívací podmínky a doporučení následných opatření: V trase biokoridoru na orné půdě zatravnit ochranný pás o minimální šířce 20 m, resp. rozšířit stávající porost na minimální šířku 20 m. Jetelotravní porost v šíři 20 m převést na trvalý luční porost s pestrou druhovou skladbou. Ve východní části biokoridoru zatravnit na pravé straně vodoteče na okraji erozně náchylného pozemku orné půdy ochranný pás o minimální šířce 10 m, optimálně zatravnit celý přilehlý svah pozemku a rozčlenit ho soustavou mezí s keřovým porostem.	

Poradové číslo: BK 5 (12100) - pokračování	Katastrální území: Mohuřice
Název: K Slavči	Mapový list 1 : 5 000 TS 9-2, 9-3
<i>Ekologicky významné liniové společenstvo</i> <i>Lokální biokoridor</i>	
Geobiocenologická typizace: (vegetační stupeň, trofická a hydrická řada) 4B-4, 4B-3, 4BC-4	Délka/šířka prvku (m): 1900/20-30
Zpracovatel a pořadové číslo v generelovém zpracování: Gergel, BK 115-120	
Luční porosty včetně existující nitrifilní vegetace budou sečeny 1-2 x ročně (nitrifilní vegetace zpočátku alespoň 2 x ročně), nebudou používány chemické ochranné prostředky a hnojiva. V krátkých úsecích lesních porostů hospodaření dle LHP, podpora listnatých dřevin, trvale zachovat břehové porosty podél vodotečí. Při obnově redukovat smrk, borovici a nahradit je dřevinami přirozené dřevinné skladby. Postupně vytvořit základ budoucího věkově a prostorově diferencovaného porostu s bohatou vnitřní strukturou obhospodařovaného pouze jemnějšími obnovními způsoby, s dřevinnou skladbou blízkou přirozené dle jednotlivých lesních typů. Dřeviny podél vodotečí ponechat přirozenému vývoji, provádět pouze běžnou údržbu a v případě potřeby zdravotní řez. V celém středním úseku zejména podél komunikace a po okraji orné půdy je navržena výsadba a dosadba vhodných dřevin, které vytvoří kvalitní porost s bohatou vnitřní strukturou a vertikálním členěním a doplní chybějící volnou zeleň v krajině. Existující ovocné výsadby podél komunikace zůstanou zatím zachovány, proveden bude zdravotní a výchovný řez a postupně v souvislosti s jejich stárnutím budou nahrazeny dřevinami přirozené dřevinné skladby. U komunikace je nutné zejména zabránit nevhodným radikálním zásahům při ošetřování silniční zeleně.	
Parcelní čísla: 32, 33/1, 35/4, 61/1, 61/2, 83, 84/1, 85/5, 88/2, 112, 140/1, 306, 310/1	

Pořadové číslo: BK 6 (12096)	Katastrální území: Mohuřice
Název: Mohuřický	Mapový list 1 : 5 000 TS 9-2, 9-3
<i>Ekologicky významné liniové společenstvo</i> <i>Lokální biokoridor</i>	
Geobiocenologická typizace: (vegetační stupeň, trofická a hydrická řada) 4B-4, 4BC-4	Délka/šířka prvku (m): 1550/20-70
Zpracovatel a pořadové číslo v generelovém zpracování: Gergel, BK 97-120	
Charakteristika současného stavu: Lokální biokoridor prochází podél východních hranic řešeného území, v celém úseku je tvořen širokou nivou Klenského potoka, která je po obou stranách dále ohraničena svahy s lesními a lučními porosty. Klenský potok v celém úseku bohatě meandruje v poměrně široké nivě, dno je kamenité, místy s nánosy jemnozrnného až písčitého sedimentu. Místě se projevuje výraznější korytotvorná činnost, rychle proudící úseky se střídají s pomalým prouděním, vytváří se i hlubší tůň. Tok je doprovázen souvislým porostem vzrostlých dřevin, převážně olše lepkavé, dále vrby křehké, dubu letního, topolu osiky, střemchy obecné, břízy bělokoré, křovitých vrb. V nivě na tok navazují extenzivně využívané a zčásti nevyužívané luční porosty s vyšší druhovou diverzitou, na podmáčených stanovištích se zastoupením mokřadních společenstev se skřípinou lesní, tužebníkem jilmovým, chrasticí rákosovitou, ostřicemi, místy s výrazným jarním aspektem s orsejem, blatouchy, sasankou. Maloplošně, zvláště v pásu podél toku, jsou porosty ruderalizované kopřivou. Od hranic řešeného území jižním směrem je podél toku mapován významný biotop se společenstvy sv. <i>Molinion</i> a <i>Alnion glutinosae</i>. Potoční niva je představována mnoha diferencovanými typy vegetace, které jsou přirozené až polokulturní, se zachovalou pestrou garniturou druhů, se zvláště chráněnými druhy rostlin (bazanovec kytkokvětý, prstnatec májový, všivec lesní). Podrobný seznam rostlinných druhů je uveden v biotopovém mapování. V této části v okolí Mohuřic je v současné době niva toku výrazně devastována pastvou a nadměrným pohybem hospodářských zvířat na silně podmáčeném stanovišti. Celá niva je ohrazena a využívána jako poměrně intenzivní pastvina, která zasahuje i do mapovaného významného biotopu se zvláště chráněnými druhy rostlin. Dochází také k maloplošným zásahům do břehových dřevinných porostů.	
Jiný způsob ochrany přírody : VKP - niva, tok	
Statut ochrany z jiných zájmů :	
Základní využívací podmínky a doporučení následných opatření: V nivě toku zamezit jakémukoliv jejímu zaplácování a výrazně negativně působící intenzivní pastvě hospodářských zvířat. Vyloučit jakékoliv negativní zásahy zejména v prostoru mapovaného biotopu s cennými rostlinnými společenstvy a zvláště chráněnými druhy rostlin. V nivě vyloučit intenzivní pastvu, porosty vrátit do původního stavu, luční společenstva včetně nitrofilních okrajů sekat 1-2 x ročně, mokřadní společenstva mimo silně podmáčené plochy 1 x za 2-3 roky. Nepoužívat chemické ochranné prostředky a hnojiva. Lokalitu dále ponechat přirozenému vývoji, zamezit veškerým negativním zásahům do toku, břehových dřevinných porostů a rostlinných společenstev v celé nivě. U břehových dřevinných porostů provádět pouze běžnou údržbu a v případě potřeby zdravotní řez.	
Parcelní čísla: 316/1, 316/2, 318, 319, 321/2, 327, 368, 374, 376/2, 379, 388/1, 388/2, 388/3, 421/2, 421/3, 434/1, 434/3, 1677/1, 1677/2, 1678, 1679	

k.ú. Slavče

Prvek lokálního územního systému ekologické stability č. 5
Biocentrum U Slavče
Mapový podklad Trhové Sviny 9-3, rozloha 3 ha
Ekologicky významný krajinný prvek
Biogeografický význam lokální

Vegetační stupeň dubojehličnatý, půda heminitrofilní, zamokřená.
Charakteristika : Funkční lokální biocentrum tvořené lučními porosty, mokřady, pobřežní vegetací a vodotečí. Doprovod Klenského potoka tvoří olše, vrby, břízy, bez černý. V bylinném patře společenstvo vlhkomilných rostlin mokřadního charakteru - ostřice, chrastice, orobínek, místy porosty kopřiv, na lukách polopřirozená směs s výskytem pryskyřníků, v okrajích vrbovky a kyprej. Výborné úkrytové možnosti pro ptactvo i zvěř, především okolo vodní nádrže, kde se spontánně vyvíjí březový, olšový a vrbový nálet.
Doporučení : Ponechat přirozenému vývoji v původním stavu. Luční porosty kosit ve druhé polovině července (není-li možné postupné kosení) s tím, že bude ponecháno alespoň 15 % nepokosené plochy jako útočiště nižších živočichů a jejich vývojových stádií. Pokosenou hmotu neodvážet, ale na místě sušit.
Kultura : Luční porost, vodoteč, mokřad se stromovou vegetací.
Uživatel : Zemědělské družstvo, restituenti.
Mapovatel : Vladimír Kavka 1995

Prvek lokálního územního systému ekologické stability č. 4
Biokoridor Klenský potok
Mapový podklad Trhové Sviny 9-3 + 9-4, délka 2,4 km
Ekologicky významný krajinný prvek
Biogeografický význam lokální

Vegetační stupeň dubojehličnatý, půda heminitrofilní, zamokřená.
Charakteristika : Funkční lokální biokoridor vedoucí tokem Klenského potoka směrem k biocentru U Slavče. Kombinace lučních a lesních společenstev, místně proložená mokřady - - výskyt blatouchu. Doprovod potoka tvoří olše lepkavá, vrby, bříza bradavičnatá, střemcha hroznovitá, borovice lesní, smrk ztepilý, bez černý, ostružiníky. Nejcennější krajinný prvek katastru Slavče.
Doporučení : Ponechat přirozenému vývoji v původním stavu. Přílehlé lokality nehnojit, kosení provádět pokud možno postupně během druhé poloviny července a ponechat alespoň 15 % nepokosené plochy jako útočiště především nižších živočichů a jejich vývojových stadií. V lese podpora listnáčů.
Kultura : Vodoteč, luční a lesní porosty.
Uživatel : Lesy České republiky, Zemědělské družstvo, restituenti.
Mapovatel : Vladimír Kavka 1995

Prvek lokálního územního systému ekologické stability č. 3
Biocentrum Nad Klením
Mapový podklad Trhové Sviny 9-4, rozloha 4 ha
Ekologicky významný krajinný prvek
Biogeografický význam lokální

Vegetační stupeň dubojehličnatý, půda mezotrofní a heminitrofilní, zamokřená.
Charakteristika : Funkční lokální biocentrum tvořené lesem a lučními porosty, pobřežní vegetací a vodotečí. Doprovod Klenského potoka tvoří olše, vrby a střemchy. Lesním porostem je borový les s příměsí listnáčů - buku, dubu, břízy a olše. V bylinném patře společenstvo vlhkomilných rostlin mokřadního charakteru - ostřice, pryskyřníky, kyprej a podobné rostliny s vysokými nároky na vlhkost substrátu. Dobré úkrytové podmínky pro ptactvo i zvěř.
Doporučení : Ponechat přirozenému vývoji v původním stavu. Luční porosty kosit ve druhé polovině července (není-li možné postupné kosení) s tím, že bude ponecháno alespoň 15 % nepokosené plochy jako útočiště nižších živočichů a jejich vývojových stadií. Pokosenou hmotu neodvážet, ale na místě sušit.
Kultura : Luční porost, vodoteč a lesní porost.
Uživatel : Zemědělské družstvo, restituenti, Lesy České republiky.
Mapovatel : Vladimír Kavka 1995

Prvek lokálního územního systému ekologické stability č. 2
Biokoridor Pod Slavečským rybníkem
Mapový podklad Trhové Sviny 9-4, délka 1,4 km
Ekologicky významný krajinný prvek
Biogeografický význam lokální

Vegetační stupeň dubohlehličitý, půda heminitrofilní, zamokřená.
Charakteristika : Funkční lokální biokoridor vycházející z biocentra Pod Lhotkou, pokračuje Keblanským potokem proti jeho toku k jihu. Kombinace lučních, lesních a mokřadních společenstev (výskyt blatouchu). Doprovod potoka tvoří olše, vrby, bříza a střemcha, v lesním porostu borovice, smrk, dub a buk. Biokoridor odbočuje v lesním komplexu na východ a přítokem Keblanského potoka přechází na potok Klenský (Dluhošťský) - biocentrum Nad Klením. Dobré úkrytové možnosti pro zvěř i hnízdní prostory pro ptactvo.
Doporučení : Ponechat v současném stavu přirozenému vývoji. Přílehlé lokality nehnojit, kosení provádět postupně nebo jednorázově ve druhé polovině července s tím, že bude ponecháno alespoň 20 % nepokosené plochy jako útočiště nižších živočichů a jejich vývojových stadií. Pokosenou hmotu neodvážet, ale na místě sušit.
Kultura : Vodoteč, luční porosty, mokřad, lesní porost.
Uživatel : Zemědělské družstvo, restituenti, Lesy České republiky.
Mapovatel : Vladimír Kavka 1995

Prvek lokálního územního systému ekologické stability č. 1
Biocentrum Pod Lhotkou
Mapový podklad Trhové Sviny 9-4, rozloha 4 ha
Ekologicky významný krajinný prvek
Biogeografický význam lokální

Vegetační stupeň dubojehličnatý, půda heminitrofilní, zamokřená.
Charakteristika : Funkční lokální biocentrum tvořené lesem a lučními porosty, kterým protéká Keglanský potok. Doprovod vodoteče tvoří olše, vrby, břízy, dále od ní porosty s borovicí, smrkem, dubem, olšemi a bukem. Mokřadní společenstva (včetně ostřic a blatouchů), dále od potoka borůvků, šťavel kyselý, bika chlupatá, svízele, metlice trsnatá, ostružiníky. Dobré úkrytové podmínky pro ptactvo i zvěř.
Doporučení : Ponechat přirozenému vývoji v původním stavu. Luční porosty kosit ve druhé polovině července (není-li možné postupné kosení) s tím, že bude ponecháno alespoň 15 % nepokosené plochy jako útočiště nižších živočichů a jejich vývojových stadií. Pokosenou hmotu neodvážet, ale na místě sušit.
Kultura : Luční porost, vodoteč a lesní porost.
Uživatel : Zemědělské družstvo, restituenti, Lesy České republiky.
Mapovatel : Vladimír Kavka 1995

Prvek lokálního územního systému ekologické stability č. 6
Biokoridor U Louzova Mlýna
Mapový podklad Trhové Sviny 8-3 + 9-3, délka 1,4 km
Ekologicky významný krajinný prvek
Biogeografický význam lokální

Vegetační stupeň dubojehličnatý, půda heminitrofilní, zamokřená.
Charakteristika : Funkční lokální biokoridor vycházející z biocentra U Slavče. pokračuje Klenským potokem jeho tokem k severu do Mohuřického biocentra. Kombinace lučních, lesních a mokřadních společenstev (výskyt blatouchu, orobince, ostřic, na sušších místech bezu černého). Doprovod potoka tvoří olše, vrby a břízy, v lesním porostu borovice, dub, smrk, bříza, bez černý a ostružiníky. Dobré úkrytové možnosti pro zvěř i hnízdní prostory pro ptactvo.
Doporučení : Ponechat v současném stavu přirozenému vývoji. Přílehlé louky nehnojit, kosení provádět postupně nebo jednorázově ve druhé polovině července s tím, že bude ponecháno alespoň 20 % nepokosené plochy jako útočiště nižších živočichů a jejich vývojových stadií. Pokosenou hmotu neodvážet, ale na místě sušit. Omezit zásahy do pobřežních porostů.
Kultura : Vodoteč, luční porosty, mokřad, lesní porost.
Uživatel : Zemědělské družstvo, restituenti, Lesy České republiky.
Mapovatel : Vladimír Kavka 1995

Prvek lokálního územního systému ekologické stability č. 7
Biocentrum Mohuřické
Mapový podklad Trhové Sviny 9-2 + 9-3, rozloha 4,5 ha
Ekologicky významný krajinný prvek
Biogeografický význam lokální

Vegetační stupeň dubojehličnatý, půda oligotrofní až mezotrofní, heminitrofilní, normální až zamokřená.
Charakteristika : Funkční lokální biocentrum tvořené lučními porosty, mokřadem, pobřežní vegetací, lesem a vodotečí. Doprovod Klenského potoka tvoří olše lepkavá a vrby. Bylinné patro tvořené ostřicemi, chrasticí, blatouchy, přechází do okolních luk. Na mnoha místech patrná degradace společenstva kopřivou dvoudomou. Biocentrum je orámované lesem (borovice, smrk, bříza, podrost borůvčí, biky, ptačinec, metlice).
Doporučení : Dodržovat LHP, provádět obnovu na cílový stav s 50 %ním zastoupením buku a příměsí jedle a dubu. Přílehlé louky nehnějí, kosení provádět postupně nebo jednorázově ve druhé polovině července s tím, že bude ponecháno alespoň 20 % nepokosené plochy jako útočiště nižších živočichů a jejich vývojových stadií. Pokosenou hmotu neodvážet, ale na místě sušit.
Kultura : Vodoteč, luční porosty, mokřad, lesní porost.
Uživatel : Zemědělské družstvo, restituenti, Lesy České republiky.
Mapovatel : Vladimír Kavka 1995

Prvek lokálního územního systému ekologické stability č. 8
Biokoridor Pod Mohuřicemi
Mapový podklad Trhové Sviny 9-2, délka 0,5 km
Ekologicky významný krajinný prvek
Biogeografický význam lokální

Vegetační stupeň dubohříšnatý, půda oligotrofní až hemioligotrofní, zamokřená až mokrá.
Charakteristika : Funkční lokální biokoridor vycházející z Mohuřického biocentra proti malému přítoku Klenského potoka vlhkými lučními porosty a lesem. Kombinace lučních, lesních a rudérálních společenstev (okolo přilehlých pozemků pravidelně obdělávaných orbou). V lesním porostu borovice, smrk, bříza, jeřáb, podrost z borůvky. Dobré úkrytové možnosti pro zvěř i hnízdní prostory pro ptactvo.
Doporučení : Ponechat v současném stavu přirozenému vývoji. Přilehlé louky nehnějí, kosení provádět postupně nebo jednorázově ve druhé polovině července s tím, že bude ponecháno alespoň 20 % nepokosené plochy jako útočiště nižších živočichů a jejich vývojových stadií. Pokosenou hmotu neodvážet, ale na místě sušit. V lese dodržovat LHP a při obnově posilovat listnáče.
Kultura : Vodoteč, luční porosty, orná půda, lesní porost.
Uživatel : Zemědělské družstvo, restituenti, Lesy České republiky.
Mapovatel : Vladimír Kavka 1995

Prvek lokálního územního systému ekologické stability č. 9
Biokoridor Do Smržoku
Mapový podklad Trhové Sviny 9-3, délka 0,5 km
Ekologicky významný krajinný prvek
Biogeografický význam lokální

Vegetační stupeň dubohříštný, půda mezotrofní, zamokřená.
Charakteristika : Nefunkční lokální biokoridor navazující na biokoridor Pod Mohuřicemi, který propojuje s biokoridorem Slaný.
Doporučení : Podél silnice vytvořit na dále neobdělávané půdě zatravněný pás šířky cca 25 metrů. Dosadit při silnici dřevinami uvedenými v textové zprávě. Dále kosit postupně či ve druhé polovině července s tím, že bude ponecháno alespoň 20 % nepokosené plochy jako útočiště nižších živočichů a jejich vývojových stadií. Pokosenou hmotu neodvážet, ale na místě sušit.
Kultura : Orná půda, luční porost, liniová zeleň podél komunikace.
Uživatel : Zemědělské družstvo, restituenti, majitelé pozemků při silnici.
Mapovatel : Vladimír Kavka 1995

k.ú. Dobrkovská Lhotka

Poradové číslo:	Katastrální území:
BC 1 (11104)	Dobrkovská Lhotka
Název:	Mapový list 1 : 5 000
U zákrutů	TS 9-2
<i>Ekologicky významný krajinný prvek</i> <i>Lokální biocentrum</i>	
Geobiocenologická typizace: (vegetační stupeň, trofická a hydrická řada) 4B-4, 4BC-4, 4A-4, 4A-3	Rozloha prvku (ha): 6,50
Zpracovatel a pořadové číslo v generelovém zpracování: Gergel, BC 115	
Charakteristika současného stavu:	
Lokální biocentrum je umístěno převážně na pravém břehu Keblanského potoka nad komunikací Trhové Sviny - Besednice. Zaujímá nivu toku s břehovými společenstvy a navazující lesní porost ve svahu mezi Keblanským potokem a jeho drobným pravostranným přítokem. Biocentrum je tvořeno kulturními lesními porosty, tvořenými mozaikou různověkých skupin s převahou borovice, s příměsí smrku, v mladých skupinách ojediněle vtroušená jedle. Zápoj je v mladých skupinách plný, ve starších mírně rozvolněný až rozvolněný, místy mezernatý. Oddělení, porost: 493A. Převažují LT: LT 4K6 - kyselá bučina borůvková na hřebtech a horních částech svahů, 4Q6 - chudá dubová jedlina borůvková s rašeliníkem na plošinách Pedologie: podzolovaná oligotrofní hnědá půda, surový moder, surový humus, velmi silně kyselá, skeletovitá, středně hluboká, mírně vlhká (LT 4K6), na vlhkém stanovišti podzolovaný pseudoglej až výrazný pseudoglej, typický surový humus, silně kyselá půda, pH, dospodu až pjh, se slepenci, na terciéru i valouny, střídavě zamokřená, drobná, dospod soudržná až vazká (LT 4Q6). Fytocenologie: lesní porosty na stanovištích kyselých bučin sv. Luzulo-Fagion a jedlových doubrav sv. Genisto germanicae-Quercion, maloplošně kulturních borů sv. Dicrano-Pinion, pod vyspělými porosty převažují druhy <i>Luzula luzuloides</i>, <i>Avenella flexuosa</i>, <i>Vaccinium myrtillus</i>, <i>Hieracium murorum</i>, <i>Melampyrum pratense</i>, <i>Pleurozium schreberi</i>, <i>Dicranum scoparium</i>, <i>Hylocomium splendens</i>, <i>Leucobryum glaucum</i>, na vlhčím stanovišti přistupují <i>Rhodococcum vitis idaea</i>, <i>Molinia arundinacea</i>, <i>Calamagrostis villosa</i>, <i>Dicranum polysetum</i>, <i>Polytrichum formosum</i>, <i>Sphagnum</i> sp. Součástí biocentra je také niva Keblanského potoka s vyvinutými břehovými společenstvy. Keblanský potok je přirozeného charakteru, v místy poměrně široké nivě bohatě meandruje. Dno je kamenité, místy s výraznějšími nánosy jemnozrnného až štěrkopískového sedimentu, časté jsou napádky větví. Rychle proudící úseky se střídají s pomalejším prouděním vody, s hlubšími tůňkami. Tok má výrazný splaveninový režim, místy dochází k břehové abrazi. V celém úseku je tok lemován kvalitním vzrostlým břehovým porostem, který se místy rozšiřuje v plošný porost. Zastoupena je zejména olše lepkavá, dále vrba křehká, krušina olšová, křovité druhy vrb, střemcha obecná, bříza bělokorá. V podrostu na silně podmáčeném stanovišti dominuje chrastice rákosovitá, místy je zastoupena skřípina lesní, vrba obecná, kostival lékařský, kopřiva dvoudomá.	

Pořadové číslo: BC 1 (11104) pokračování	Katastrální území: Dobrkovská Lhůtka
Název: U zákrutů	Mapový list 1 : 5 000 TS 9-2
<i>Ekologicky významný krajinný prvek Lokální biocentrum</i>	
Geobiocenologická typizace: (vegetační stupeň, trofická a hydrická řada) 4B-4, 4BC-4, 4A-4, 4A-3	Rozloha prvku (ha): 6,50
Zpracovatel a pořadové číslo v generelovém zpracování: Gergel, BC 115	
Jiný způsob ochrany přírody : VKP - les, niva, tok	
Statut ochrany z jiných zájmů :	
Základní využívací podmínky a doporučení následných opatření: V současnosti nevyhovující dřevinná skladba, bez zastoupení dřevin přirozené skladby. V předmyšných porostech hospodaření dle LHP, při obnově včas do porostů zavést dostatečný podíl jedle, dubu a buku, jako vtroušenou dřevinu zavést lípu. Obnovovat především clonnými sečemi kombinovanými s maloplošnými předsunutými prvky pro buk, jedli a dub. Kvalitní borovici ponechávat jako výstavky zarůst do mlazin. Břízu nalétlou na obnovované plochy ponechat jako meliorační dřevinu v porostech až do jejího fyzického věku. Podíl borovice a smrku výhledově (2-3 obmýtí) snížit na 40-50%. <i>Přirozená dřevinná skladba:</i> 4K - jd 1-2, bo 0-+, bk 5-7, db +-3, lp +-1, bř 0-+, 4Q - db 3-4, bk 1-2, jd 3-4, sm 0-+, bo 0-2, bř, os + V nivě toku víceméně bez zásahu, lokalitu ponechat přirozenému vývoji, u dřevin provádět pouze běžnou údržbu a v případě potřeby zdravotní řez.	
Parcelní čísla: 1263, 1273/1, 1274/1, 1274/3, 1280, 1281/1, 1642	

Pořadové číslo: BC 2 (11105)	Katastrální území: Dobřikovská Lhotka
Název: Pod Skalkou	Mapový list 1 : 5 000 ČK 0-3
<i>Ekologicky významný krajinný prvek</i> <i>Lokální biocentrum</i>	
Geobiocenologická typizace: (vegetační stupeň, trofická a hydrická řada) 4BC-4, 4B-4, 4B-3	Rozloha prvku (ha): 3,20
Zpracovatel a pořadové číslo v generelovém zpracování: Gergel, BC 114	
Charakteristika současného stavu: Lokální biocentrum je vymezeno v poměrně široké nivě Keblanského potoka v místě zaústění jeho drobného levostranného bezejmenného přítoku od obce Besednice. Níva je ohraničena lesním porostem. Biocentrum zasahuje do řešeného území pouze velmi okrajově, z převážné části je umístěno v okrese Český Krumlov. Keblanský potok je přirozeného charakteru, v široké nivě bohatě meandruje. Dno je kamenité, místy s výraznějšími nánosy jemnozrnného až štěrkopískového sedimentu, časté jsou napadávký větvi v korytě. Rychle proudící úseky se střídají s pomalejším prouděním vody, s hlubšími tůňmi. Tok má výrazný splaveninový režim, místy dochází k břehové abrazi. Při vyšších srážkách se tok vylévá do prostoru nivy. V celém úseku je Keblanský potok lemován kvalitním vzrostlým břehovým porostem, ve kterém je zastoupena zejména olše lepkavá, vrba křehká, dále vtroušeně krušina olšová, křovité druhy vrb, střemcha obecná, topol osika, dub letní, bříza bělokora. Drobný přítok je upraven a opevněn do dna i boku betonovou dlažbou, bez možnosti přirozené revitalizace. Lemován je pouze náletem olše lepkavé, borovice lesní a břízy bělokora. V horní části drobného přítoku se nachází využívaný luční porost s poměrně pestrá druhovou skladbou. V celé zbývající části biocentra v nivě toku převažují nevyužívané travinobylinné a převážně mokřadní společenstva rostlin na silně podmačeném stanovišti, místy s vtroušenými skupinkami náletových dřevin, zejména olše lepkavé. Na levé straně přítoku jsou maloplošně použity na silně podmačeném stanovišti nevhodné výsadby smrčků. V mokřadních společenstvech jsou zastoupeny skřípina lesní, tužebník jilmový, vrbina obecná, pcháč bahenní, ostrice, sítina rozkladitá, chrastice rákosovitá, blatouch bahenní, kostival lékařský, rdesno hadí kořen, ojediněle s ruderalizací kopřivou dvoudomou.	
Jiný způsob ochrany přírody : VKP - niva, tok	
Statut ochrany z jiných zájmů :	
Základní využívací podmínky a doporučení následných opatření: Celou lokalitu ponechat víceméně bez výraznějšího zásahu přirozenému vývoji, nivu nezalesňovat (zejména nevhodnými smrkovými kulturami), vyloučit veškeré činnosti negativně ovlivňující lokalitu. Luční společenstva sekat 1-2 x ročně, nevyužívaná travinobylinná společenstva překosit 1 x	

Pořadové číslo: BC 2 (11105) - pokračování	Katastrální území: Dobrkovská Lhotka
Název: Pod Skalkou	Mapový list 1 : 5 000 ČK 0-3
<i>Ekologicky významný krajinný prvek</i> <i>Lokální biocentrum</i>	
Geobiocenologická typizace: (vegetační stupeň, trofická a hydrická řada) 4BC-4, 4B-4, 4B-3	Rozloha prvku (ha): 3,20
Zpracovatel a pořadové číslo v generelovém zpracování: Gergel, BC 114	
ročně, mokřadní společenstva mimo silně podmáčené plochy 1 x za 2-3 roky, omezit případnou ruderalizaci společenstev a souvislý zárust náletovými dřevinami. Nepoužívat chemické ochranné prostředky a hnojiva. Trvale zachovat přirozený charakter celého Keblanského potoka, neprovádět žádné technické úpravy. Drobný levostranný přítok revitalizovat, optimálně odstranit tvrdé opevnění koryta a obnovit původní přirozený charakter toku, včetně hydrologických podmínek stanoviště. Současné dřevinné porosty ponechat přirozenému vývoji, zajistit pouze běžnou údržbu a v případě potřeby zdravotní řez. Optimálně odstranit nevhodnou smrkovou výsadbu. Podél drobného přítoku bude provedena dosadba vhodných dřevin s cílem vytvoření kvalitního porostu s bohatou vnitřní strukturou a vertikálním členěním. Dosadba bude plynule navazovat na vzrostlé břehové porosty podél Keblanského potoka.	
Parcelní čísla: 1319, 1351	

Pořadové číslo: BC 3 (11106)	Katastrální území: Dobrkovská Lhotka
Název: Pod hrby	Mapový list 1 : 5 000 ČK 0-3, TS 9-3
<i>Ekologicky významný krajinný prvek</i> <i>Lokální biocentrum</i>	
Geobiocenologická typizace: (vegetační stupeň, trofická a hydrická řada) 4BC-4, 4B-4, 4B-3, 4AB-3	Rozloha prvku (ha): 5,05
Zpracovatel a pořadové číslo v generelovém zpracování: Gergel, BC 116	
Charakteristika současného stavu: Lokální biocentrum je vymezeno na Keblanském potoce v úseku mezi intravilány obcí Dobrkovská Lhotka a Dobrkov. Tvořeno je tokem s břehovými porosty a navazujícími mokřadními a lučními společenstvy. Keblanský potok je přirozeného charakteru, bohatě meandruje. Dno je kamenité, místy s výraznějšími nánosy jemnozrnného až písčitého sedimentu, časté jsou napadávký větvi v korytě. Rychle proudící úseky se střídají s pomalejším prouděním vody, s hlubšími tůňkami, místy dochází k břehové abrazi. V celém úseku je Keblanský potok lemován kvalitním vzrostlým břehovým porostem, ve kterém je zastoupena zejména olše lepkavá, dále vtroušené krušina olšová, vrba křehká, křovité druhy vrb, střemcha obecná, topol osika, dub letní, borovice lesní, bříza bělokorá. Na tok navazují na silně podmáčeném stanovišti poměrně rozsáhlá nevyužívaná mokřadní společenstva, zejména na pravé straně toku a v místech jednotlivých vývěrů a zaústění drobných přítoků. V mokřadních společenstvech jsou zastoupeny skřipina lesní, síťina rozkladitá, vrbina obecná, dále tužebníček jilmový, pcháček bahenní, ostřice, chrastice rákosovitá, blatouch bahenní, kostival lékařský, kyprej vrbice, tuřice třeslicovitá, kopřiva dvoudomá. Na levém břehu dále navazují ve svahu využívané polopřirozené luční porosty, maloplošné nad nivou toku s drobným políčkem orné půdy.	
Jiný způsob ochrany přírody : VKP - tok	
Statut ochrany z jiných zájmů :	
Základní využívací podmínky a doporučení následných opatření: Celou lokalitu ponechat víceméně bez výraznějšího zásahu přirozenému vývoji, vyloučit veškeré činnosti negativně ovlivňující lokalitu, zejména trvale zachovat přirozený charakter Keblanského potoka, neprovádět žádné jeho technické úpravy. Luční společenstva sekat 1-2 x ročně, mokřadní společenstva mimo silně podmáčené plochy 1 x za 2-3 roky, omezit případnou ruderalizaci společenstev. Nepoužívat chemické ochranné prostředky a hnojiva. Optimálně znovuzatravnit drobné políčko orné půdy, nebo ho alespoň dále nerozšiřovat, nepoužívat na něm chemické ochranné prostředky a hnojiva. Trvale zachovat vzrostlé břehové dřevinné porosty, ponechat je přirozenému vývoji, provádět pouze běžnou údržbu a v případě potřeby zdravotní řez.	
Parcelní čísla: 1539, 1540, 1541, 1560, 1561, 1563, 1567, 2349, 2350, 2352/2, 2356/1, 2356/2, 2356/3, 2356/4, 2356/5, 2360, 2362, 2363, 2364/1, 2364/2, 2377/2	

Pořadové číslo:	Katastrální území:
BC 4 (11107)	Dobrkovská Lhotka
Název:	Mapový list 1 : 5 000
U Slavče	TS 9-4
<i>Ekologicky významný krajinný prvek Lokální biocentrum</i>	
Geobiocenologická typizace: (vegetační stupeň, trofická a hydrická řada) 4BC-4, 4B-4, 4B-3	Rozloha prvku (ha): 8,60
Zpracovatel a pořadové číslo v generelovém zpracování: Gergel, BC 117	
Charakteristika současného stavu: Lokální biocentrum se nachází převážně na pravém břehu Keblanského potoka v části nad obcí Dobrkovská Lhotka. Do řešeného území biocentrum zasahuje pouze velmi okrajově, zejména břehovými porosty na levém břehu toku. Celá zbývající část biocentra v k. ú. Slavče je zpracována v Plánu ÚSES pro katastrální území Slavče (Škopek, 1995). Keblanský potok je ve spodním úseku přirozeného charakteru, poměrně bohatě meandruje. Dno je kamenité, místy s výraznými nánosy jemnozrnného až štěrkopískového sedimentu, časté jsou napadávký větví v korytě. Rychle proudící úseky se střídají s pomalejším prouděním vody, s hlubšími tůňkami. Tok má výrazný splaveninový režim, místy dochází k břehové abrazi. Při vyšších srážkách se tok vylévá do navazujících společenstev. V horním úseku je Keblanský potok upraven, zahlouben a opevněn do dna i boku kamennou dlažbou, s rychle proudící vodou, bez možnosti přirozené revitalizace. Keblanský potok je lemován vzrostlým souvislým břehovým porostem, ve kterém je zastoupena zejména olše lepkavá, dále bříza bělokorá, krušina olšová, křovité druhy vrb, střemcha obecná, topol osika, dub letní. Podél upraveného úseku je vytvořen místy i hustý nálet dřevin. Břehové porosty se dále v k. ú. Slavče rozšiřují v plošný dřevinný porost. Na břehové porosty toku dále navazují využívané vlhké luční porosty s vyšší druhovou diverzitou a v místě jednotlivých vývěrů a podmáčených stanovišť mokřadní společenstva se skřípínou lesní, chrasticí rákosovitou, tužebníkem jilmovým, orobincem širokolistým, vrbínou obecnou, sítinou rozkladitou, ostřicemi, pcháčem bahenním, místy s ruderalizací kopřivou dvoudomou.	
Jiný způsob ochrany přírody : VKP - les, tok	
Statut ochrany z jiných zájmů :	
Základní využívací podmínky a doporučení následných opatření: Luční společenstva navazující na tok sekat 1-2 x ročně, nevyužívaná mokřadní společenstva mimo silně podmáčené plochy překosit 1 x za 2-3 roky, omezit případnou ruderalizaci společenstev a souvislý zárůst náletovými dřevinami. Nepoužívat chemické ochranné prostředky a hnojení. Trvale zachovat přirozený charakter Keblanského potoka, neprovádět žádné další technické úpravy. Horní úsek toku revitalizovat, optimálně odstranit tvrdé opevnění koryta a obnovit původní přirozený charakter toku, včetně hydrologických podmínek stanoviště. Umožnit jeho alespoň částečnou korytotvornou činnost. Současné dřevinné porosty ponechat přirozenému vývoji, provádět pouze běžnou údržbu a v případě potřeby zdravotní řez. V místech s hustým náletem dřevin provést jejich probírku a umožnit další vývoj vitálních jedinců, které vytvoří porost s bohatou vnitřní strukturou a vertikálním členěním.	
Parcelní čísla: 2452/2, 2452/3, 2454, 2455/1, 2458/1, 2458/2, 2462/1, 2462/3, 2462/4	

Pořadové číslo: BK 1 (12107)	Katastrální území: Dobrkovská Lhotka
Název: Pod Tesákem	Mapový list 1 : 5 000 TS 9-4
<i>Ekologicky významné liniové společenstvo</i> <i>Lokální biokoridor</i>	
Geobiocenologická typizace: (vegetační stupeň, trofická a hydrická řada) 4B-4, 4AB-4	Délka/šířka prvku (m): 600/20-30
Zpracovatel a pořadové číslo v generelovém zpracování: Gergel, BK 117-131	
Charakteristika současného stavu: Lokální biokoridor je tvořen horním úsekem Keblanského potoka. Dále za hranicemi řešeného území se napojuje na Klenský potok - biocentrum Nad Klením. Biokoridor prochází v celém úseku podél katastrálních hranic řešeného území, vymezen byl v Plánu ÚSES Slavče (<i>Škopek</i>). Ve spodním úseku je Keblanský potok upraven, zahlobben a opevněn do dna i boku kamennou dlažbou, s rychle proudící vodou, bez možnosti přirozené revitalizace. Prochází po okraji lesního porostu, lemován je vzrostlými břehovými porosty s olší lepkavou, dále se zastoupením břízy bělokoré, buku lesního, krušiny olšové. Na pravé straně navazuje lesní porost s borovicí, smrkem, místy se zastoupením buku. Na levé straně toku navazuje nevyužívaný luční porost, na podmáčeném stanovišti se sítinou rozkladitou, vrbinou obecnou, pcháčem bahenním. Keblanský potok v horním úseku je již přirozeného charakteru, meandruje. Dno je kamenité, místy s nánosy jemnozrnného až štěrkopískového sedimentu, časté jsou napádky větvi v korytě. Rychle proudící úseky se střídají s pomalejším prouděním vody, místy s hlubšími tůňkami. Tok je doprovázen lučními společenstvy a v krátkých úsecích lesním porostem (odd. 500 C, D), na prosvětlených úsecích je vytvořen vzrostlý břehový porost s olší lepkavou, dále s břízou bělokorou, dubem letním, střemchou obecnou, krušinou olšovou.	
Jiný způsob ochrany přírody : VKP - les, tok	
Statut ochrany z jiných zájmů :	
Základní využívací podmínky a doporučení následných opatření: Luční společenstva navazující na tok sekat 1-2 x ročně, nevyužívaná mokřadní společenstva mimo silně podmáčené plochy překosit 1 x za 2-3 roky, omezit případnou ruderalizaci společenstev. Nepoužívat chemické ochranné prostředky a hnojiva. Trvale zachovat přirozený charakter Keblanského potoka, neprovádět žádné další technické úpravy. Spodní úsek toku revitalizovat, optimálně odstranit tvrdé opevnění koryta a obnovit původní přirozený charakter toku. V krátkých úsecích v lesním porostu hospodaření dle LHP, podpora listnatých dřevin, trvale zachovat břehové porosty podél toku. Při obnově v trase biokoridoru redukovat smrk, borovici a nahradit je dřevinami přirozené dřevinné skladby. Postupně vytvořit základ budoucího věkové a prostorově diferencovaného porostu s bohatou vnitřní strukturou obhospodařovaného pouze jemnějšími obnovními způsoby, s dřevinnou skladbou blízkou přirozené dle jednotlivých lesních typů. Současné břehové porosty podél toku ponechat přirozenému vývoji, provádět pouze běžnou údržbu a v případě potřeby zdravotní řez. V místech s hustým náletem dřevin provést jejich probírku a umožnit další vývoj vitálních jedinců, které vytvoří porost s bohatou vnitřní strukturou a vertikálním členěním.	
Parcelní čísla: 2474/1, 2474/3, 2474/4, 2475, 2476, 2477	

Poradové číslo: BK-2 (12106)	Katastrální území: Dobrkovská Lhotka
Název: Lhotka	Mapový list 1 : 5 000 TS 9-3, 9-4
<i>Ekologicky významné liniové společenstvo</i> <i>Lokální biokoridor</i>	
Geobiocenologická typizace: (vegetační stupeň, trofická a hydrická řada) 4B-4, 4BC-4	Délka/šířka prvku (m): 600/20-40
Zpracovatel a pořadové číslo v generelovém zpracování: Gergel, BK 116-117	
Charakteristika současného stavu: Lokální biokoridor je tvořen horním úsekem Keblanského potoka, prochází mezi intravilány obcí Lhotka a Dobrkovská Lhotka. Keblanský potok si z větší části udržuje přirozený charakter, meandruje. Dno je kamenité, místy s nánosy jemnozrnného až štěrkopískového sedimentu, časté jsou napadávký větvi v korytě. Rychle proudící úseky se střídají s pomalejším prouděním vody, místy s vytvořenými tůňkami. Mimo krátký úsek nad komunikací pod biocentrem je tok lemován souvislým porostem vzrostlých dřevin, zejména olše lepkavé, dále vtroušeně s břízou bělokorou, topolem osikou, křovitými druhy vrb, krušinou olšovou. Keblanský potok protéká vlhkými lučními porosty, místy na podmáčeném stanovišti se zastoupením mokřadních společenstev se skřípínou lesní, chřasticí rákosovitou, tužebníkem jilmovým, totenem krvavcem, suchopýrem úzkolistým, pcháčem bahenním, sítinou rozkladitou. Ve střední části biokoridoru v úseku mezi komunikacemi je na toku vybudován rybník, který je lemován zejména na pravém břehu a ve výtopě místním porostem vzrostlých dřevin, břízy bělokoré, olše lepkavé, topolu osiky. Na pravé straně rybníka dále navazuje borový lesík. Litorální porost není téměř vyvinut, vytvořeny jsou pouze slabé fragmenty sítě rozkladité, zblochanu vodního, chřastice rákosovité.	
Jiný způsob ochrany přírody : VKP - rybník, tok	
Statut ochrany z jiných zájmů :	
Základní využívací podmínky a doporučení následných opatření: Luční společenstva navazující na tok sekat 1-2 x ročně, nevyužívaná mokřadní společenstva mimo silně podmáčené plochy překosit 1 x za 2-3 roky, omezit případnou ruderalizaci společenstev. Nepoužívat chemické ochranné prostředky a hnojiva. Trvale zachovat přirozený charakter Keblanského potoka, neprovádět žádné další technické úpravy. Současné břehové porosty podél toku a rybníku ponechat přirozenému vývoji, provádět pouze běžnou údržbu a v případě potřeby zdravotní řez. V místech s chybějícím břehovým porostem provést dosadbu dřevin skupinovitého charakteru, který vytvoří porost s bohatou vnitřní strukturou a vertikálním členěním. Plynule bude navazovat na dále pokračující vzrostlé břehové porosty podél toku.	
Parcelní čísla: 1605/1, 1605/2, 1605/3, 1605/4, 1606, 1631/1, 1631/2, 2392/1, 2393/1, 2393/3, 2415/1, 2438/4, 2439, 2441/2, 2445/1, 2452/2, 2452/5	

Pořadové číslo: BK 3 (12247)	Katastrální území: Dobrkovská Lhotka
Název: K Velkému Kamenu	Mapový list 1 : 5 000 ČK 0-3, 0-4, TS 9-3
<i>Ekologicky významné liniové společenstvo</i> <i>Lokální biokoridor</i>	
Geobiocenologická typizace: (vegetační stupeň, trofická a hydrická řada) 4B-4, 4AB-4, 4AB-3	Délka/šířka prvku (m): 950/20-40
Zpracovatel a pořadové číslo v generelovém zpracování: Gergel, BK 116-0	
Charakteristika současného stavu: Lokální biokoridor je tvořen drobným bezejmenným levostranným přítokem Keblanského potoka. Dále za hranicemi řešeného území se napojuje na územní systém ekologické stability zpracovaný v okrese Český Krumlov. Tok si v celém úseku udržuje přirozený charakter, meandruje. Dno je kamenité, místy s nánosy jemnozrnného až písčitého sedimentu, časté jsou napadávký větví v korytě. Rychle proudící úseky se střídají s pomalejším prouděním vody, místy s jednotlivými tůňkami. Pouze v spodní části nad silnicí je tok ovlivněn výstavbou hřiště, ale charakter vlastního toku zůstává z větší části zachován. Tok je v celém úseku doprovázen mozaikou využívaných a nevyužívaných lučních společenstev, na podmáčeném stanovišti mokřadních společenstev a v krátkých úsecích výběžků lesních porostů (převážně odd. 104). V jihozápadní části se u hranic řešeného území biokoridor napojuje na lesní komplex pod Velkým Kamenem. Tok je lemován vzrostlým břehovým porostem s olší lepkavou, dále s břízou bělokorou, dubem letním, topolem osikou, střemchou obecnou, krušinou olšovou, křovitými druhy vrby, jasanem ztepilým, bezem černým. Na tok navazuje lesní porost se smrkem, dále s borovicí, bukem, dubem, břízou a osikou. Na pravé straně toku se nachází poměrně intenzivně využívaná pastvina, která zasahuje až do dřevinných porostů.	
Jiný způsob ochrany přírody : VKP - les, tok	
Statut ochrany z jiných zájmů :	
Základní využívací podmínky a doporučení následných opatření: Luční společenstva navazující na tok sekat 1-2 x ročně, nevyužívaná travinobylinná společenstva překosit 1 x ročně a nevyužívaná mokřadní společenstva mimo silně podmáčené plochy překosit 1 x za 2-3 roky, omezit případnou ruderalizaci společenstev. Nepoužívat chemické ochranné prostředky a hnojiva. Trvale zachovat přirozený charakter toku, neprovádět jeho technické úpravy. V spodním úseku u obce nezasahovat při stavebních aktivitách do koryta a břehových porostů. V krátkých úsecích v lesním porostu hospodaření dle LHP, podpora listnatých dřevin, trvale zachovat břehové porosty podél toku. Při obnově v trase biokoridoru redukovat smrk, borovici a nahradit je dřevinami přirozené dřevinné skladby. Postupně vytvořit základ budoucího věkově a prostorově diferencovaného porostu s bohatou vnitřní strukturou obhospodařovaného pouze jemnějšími obnovními způsoby, s dřevinnou skladbou blízkou přirozené dle lesních typů. Současné břehové porosty podél toku ponechat přirozenému vývoji, provádět pouze běžnou údržbu a v případě potřeby zdravotní řez. Omezit volný vstup hospodářských zvířat z pastviny do navazujících dřevinných porostů.	
Parcelní čísla: 2385/1, 2387/1, 2389, 2390, 2391, 2393/1, 2396/1, 2397/1, 2397/9, 2397/10, 2401, 2615, 2617/2, 2617/3, 2619, 2625	

Poradové číslo: BK 4 (12105)	Katastrální území: Dobrkovská Lhotka
Název: Nad Hamrem	Mapový list 1 : 5 000 TS 9-3, ČK 0-3
<i>Ekologicky významné liniové společenstvo</i> <i>Lokální biokoridor</i>	
Geobiocenologická typizace: (vegetační stupeň, trofická a hydrická řada) 4B-4, 4BC-4	Délka/šířka prvku (m): 1100/20-60
Zpracovatel a pořadové číslo v generelovém zpracování: Gergel, BK 114-117	
Charakteristika současného stavu: Lokální biokoridor je tvořen v celém úseku Keblanským potokem s jeho břehovými a doprovodnými společenstvy. V spodní části prochází souběžně s hranicemi okresu Český Krumlov. Keblanský potok je přirozeného charakteru, meandruje. Dno je kamenité, místy s nánosy jemnozrnného až šterkopískového sedimentu, časté jsou napádky větví v korytě. Rychle proudící úseky se střídají s pomalejším prouděním vody, místy s hlubšími tůňkami. Biokoridor prochází v poměrně úzké nivě sevřené svahy s navazujícími lučními a lesními porosty. V spodní části se niva postupně rozšiřuje. Drobné mokřadní loučky jsou převážně nevyužívané nebo extenzivně sečené. Místy se vytváří na podmáčeném stanovišti mokřadní společenstva rostlin. Tok je na prosvětlených úsecích lemován vzrostlými břehovými porosty s olší lepkavou, dále s břízou bělokorou, vrbou křehkou, dubem letním, jasanem ztepilým, střemchou obecnou, krušinou olšovou. Dále navazuje jehličnatý porost se smrkem, borovicí (odd. 493 D, 494 A), který okrajově zasahuje do trasy biokoridoru. Ve střední části biokoridoru jsou nad nivou vybudovány drobné rybníčky, které jsou lemovány porostem vzrostlých dřevin s obdobným druhovým složením jako má tok. Na hladině se vytváří okřehková společenstva.	
Jiný způsob ochrany přírody : VKP - les, tok, niva, rybník	
Statut ochrany z jiných zájmů :	
Základní využívací podmínky a doporučení následných opatření: Trvale zachovat přirozený charakter Keblanského potoka, neprovádět žádné technické úpravy koryta. Luční společenstva navazující na tok sekat 1-2 x ročně, drobné mokřadní loučky 1 x za 2-3 roky, mokřadní společenstva mimo silně podmáčené plochy překosit 1 x za 2-3 roky, omezit případnou ruderalizaci společenstev. Nepoužívat chemické ochranné prostředky a hnojiva. V krátkých úsecích v lesním porostu zasahujícím do biokoridoru hospodaření dle LHP, podpora listnatých dřevin, trvale zachovat břehové porosty podél toku. Při obnově v trase biokoridoru redukovat smrk, borovici a nahradit je dřevinami přirozené dřevinné skladby. Postupně vytvořit základ budoucího věkově a prostorově diferencovaného porostu s bohatou vnitřní strukturou obhospodařovaného pouze jemnějšími obnovními způsoby, s dřevinnou skladbou blízkou přirozené dle jednotlivých lesních typů. Současné břehové porosty podél toku ponechat přirozenému vývoji, provádět pouze běžnou údržbu a v případě potřeby zdravotní řez.	
Parcelní čísla: 1351, 1354/2, 1355/1, 1426, 1437/1, 1437/2, 1450, 1451, 1455/1, 1456/1, 1456/2, 1456/3, 1461/1, 1461/2, 1462, 1537, 2330/6, 2331, 2332, 2333, 2334/1, 2334/2, 2337/1, 2337/2, 2339, 2341/1, 2341/2, 2341/3, 2342, 3862	

Poradové číslo: BK 5 (12100)	Katastrální území: Dobrkovská Lhotka
Název: K Mohuřicím	Mapový list 1 : 5 000 TS 9-2
<i>Ekologicky významné liniové společenstvo</i> <i>Lokální biokoridor</i>	
Geobiocenologická typizace: (vegetační stupeň, trofická a hydrická řada) 4B-4, 4B-3, 4BC-4	Délka/šířka prvku (m): 150/20-30
Zpracovatel a pořadové číslo v generelovém zpracování: Gergel, BK 115-120	
Charakteristika současného stavu: Lokální biokoridor propojuje povodí Keblanského a Klenského potoka mělkou terénní depresí, z větší části podél drobných bezejmenných vodotečí. V řešeném území prochází pouze ve velmi krátkém úseku, z převážné části je vymezen v k. ú. Mohuřice. V západní části biokoridor prochází v krátkém úseku nad Keblanským potokem podél drobné vodoteče lesním porostem. Les je převážně borový, s příměsí smrku, vtroušeně břízy, jeřábu, dubu, buku (odd. 492 D). Vodoteč protéká v zařízlém korytě, po obou stranách ohraničena svahy s lesním porostem. Na prosvětlených úsecích je doprovázena vzrostlým porostem olše lepkavé, dále břízy bělokoré, střemchy obecné, krušiny olšové. Udrží si přirozený charakter, dno je kamenité, místy s nánosy jemnozrnného až písčitého sedimentu. Rychle proudící úseky se střídají s pomalejším prouděním, místy i s hlubšími tůňkami. Místy, zejména ve spodním úseku, i výrazněji meandruje. Nad lesním porostem již mimo řešené k. ú. biokoridor prochází po jeho okraji na jetelotravním porostu a přechází komunikaci, která je lemována mezerovitou linií ovocných dřevin, jabloně, hrušně, vtroušeně s dubem, třešní, břízou, slivoní švestkou, bezem černým. Podél komunikace je tvořen ornou půdou. Pod silnicí se biokoridor napojuje na úzký pás využívaného lučního porostu a dále na drobnou vodoteč tvořící levostranný přítok Klenského potoka. Vodoteč je doprovázena souvislým porostem vzrostlých dřevin, olše lepkavé, dále vrby křehké, břízy bělokoré, topolu osiky, bezu černého. V spodní části se vodoteč napojuje na lesní porost (odd. 491 C), převážně borový, místy se zastoupením smrku, buku, po okraji podél vodoteče s místy poměrně širokým pásem olše lepkavé, dále s dubem, břízou, třešní, osikou, střemchou, krušinou. Na pravé straně vodoteče navazuje erozně velmi náchylný pozemek orné půdy. Podél koryta je vytvořen poměrně široký pás nitrofilní vegetace s dominantní kopřivou dvoudomou.	
Jiný způsob ochrany přírody : VKP - les, tok	
Statut ochrany z jiných zájmů :	
Základní využívací podmínky a doporučení následných opatření: V trase biokoridoru na orné půdě zatravnit ochranný pás o minimální šířce 20 m, resp. rozšířit stávající porost na minimální šířku 20 m. Jetelotravní porost v šíři 20 m převést na trvalý luční porost s pestrou druhovou skladbou. Ve východní části biokoridoru zatravnit na pravé straně vodoteče na okraji erozně náchylného pozemku orné půdy ochranný pás o minimální šířce 10 m, optimálně zatravnit celý přilehlý svah pozemku a rozčlenit ho soustavou mezí s keřovým porostem.	

Pořadové číslo: BK 5 (12100) - pokračování	Katastrální území: Dobrkovská Lhotka
Název: K Mohuřicím	Mapový list 1 : 5 000 TS 9-2
<i>Ekologicky významné liniové společenstvo</i> <i>Lokální biokoridor</i>	
Geobiocenologická typizace: (vegetační stupeň, trofická a hydrická řada) 4B-4, 4B-3, 4BC-4	Délka/šířka prvku (m): 150/20-30
Zpracovatel a pořadové číslo v generelovém zpracování: Gergel, BK 115-120	
Luční porosty včetně existující nitrofilní vegetace budou sečeny 1-2 x ročně (nitrofilní vegetace zpočátku alespoň 2 x ročně), nebudou používány chemické ochranné prostředky a hnojiva. V krátkých úsecích lesních porostů hospodaření dle LHP, podpora listnatých dřevin, trvale zachovat břehové porosty podél vodotečí. Při obnově redukovat smrk, borovici a nahradit je dřevinami přirozené dřevinné skladby. Postupně vytvořit základ budoucího věkově a prostorově diferencovaného porostu s bohatou vnitřní strukturou obhospodařovaného pouze jemnějšími obnovními způsoby, s dřevinnou skladbou blízkou přirozené dle jednotlivých lesních typů. Dřeviny podél vodotečí ponechat přirozenému vývoji, provádět pouze běžnou údržbu a v případě potřeby zdravotní řez. V celém středním úseku zejména podél komunikace a po okraji orné půdy je navržena výsadba a dosadba vhodných dřevin, které vytvoří kvalitní porost s bohatou vnitřní strukturou a vertikálním členěním a doplní chybějící volnou zeleň v krajině. Existující ovocné výsadby podél komunikace zůstanou zatím zachovány, proveden bude zdravotní a výchovný řez a postupně v souvislosti s jejich stárnutím budou nahrazeny dřevinami přirozené dřevinné skladby. U komunikace je nutné zejména zabránit nevhodným radikálním zásahům při ošetřování silniční zeleně.	
Parcelní čísla: 1291	

Pořadové číslo: BK 6 (12104)	Katastrální území: Dobrkovská Lhotka
Název: Keblanský potok	Mapový list 1 : 5 000 TS 9-2, ČK 0-2, 0-3
<i>Ekologicky významné liniové společenstvo Lokální biokoridor</i>	
Geobiocenologická typizace: (vegetační stupeň, trofická a hydrická řada) 4B-4, 4BC-4	Délka/šířka prvku (m): 1000/20-50
Zpracovatel a pořadové číslo v generelovém zpracování: Gergel, BK 114-115	
Charakteristika současného stavu: Lokální biokoridor je tvořen v celém úseku Keblanským potokem s jeho břehovými a doprovodnými společenstvy. Prochází souběžně s hranicemi okresu Český Krumlov. Keblanský potok si udržuje přirozený charakter, meandruje. Dno je kamenité, místy s nánosy jemnozrnného až šterkopískového sedimentu, časté jsou napadávký větvi v korytě. Rychle proudící úseky se střídají s pomalejším prouděním vody, místy s hlubšími tůňkami. Biokoridor prochází v široké nivě sevřené svahy s navazujícími lesními porosty. Tok je lemován vzrostlými břehovými porosty s olší lepkavou, dále vtroušeně s břizou bělokorou, vrbou křehkou, dubem letním, jasanem ztepilým, střemchou obecnou, krušinou olšovou. Místy v horním úseku prochází pouze po okraji lesního porostu, bez výraznějšího zachování listnatých břehových porostů. V spodní části je niva přirozeného charakteru, na podmáčeném stanovišti s převážně nevyužívanými travinobylinnými a mokřadními společenstvy, místy s plošným porostem zejména olše lepkavé. V horním úseku je v současné době nevyužívaný travinobylinný a mokřadní porost (v části extenzivně sečený), s výrazným zastoupením zejména konopice. Místně se vyskytuje skřípina lesní, kostival lékařský, ostřice, vrbina obecná. V téměř celé ploše nivy jsou provedeny na silně podmáčeném stanovišti mladé výsadby smrku a jasanu. Při vyšších srážkách se tok rozlévá v ploše nivy.	
Jiný způsob ochrany přírody : VKP - tok, niva	
Statut ochrany z jiných zájmů :	
Základní využívací podmínky a doporučení následných opatření: Trvale zachovat přirozený charakter Keblanského potoka, neprovádět žádné technické úpravy koryta. Nivu souvisle nezalesňovat, zejména nevhodnými smrkovými výsadbami. Existující rozsáhlejší smrkové výsadby v nivě je vhodné odstranit. Zachovat volná travinobylinná a mokřadní společenstva v nivě, postupně obnovit jejich vyšší druhovou diverzitu odpovídající danému stanovišti. Luční společenstva v nivě sekat 1-2 x ročně, nevyužívaná travinobylinná společenstva 1 x ročně (porosty s vyšší ruderalizací zpočátku 2 x ročně), mokřadní společenstva mimo silně podmáčené plochy překosit 1 x za 2-3 roky, omezit ruderalizaci společenstev. Nepoužívat chemické ochranné prostředky a hnojiva. Současné břehové porosty podél toku a v spodní části nivy ponechat přirozenému vývoji, provádět pouze běžnou údržbu a v případě potřeby zdravotní řez. V horním úseku v místech s chybějícím břehovým porostem je vhodné provést v těchto částech podél toku dosadbu dřevin s cílem vytvoření kvalitního porostu s bohatou vnitřní strukturou a vertikálním členěním, který bude plynule navazovat na dále pokračující vzrostlé břehové porosty.	
Parcelní čísla: 1312, 1319	

Dokumentaci je plně respektováno i území Přírodního parku Soběnovská vrchovina a přírodní památka Ďáblík. V nejvyšší možné míře jsou chráněny lesní plochy a respektováno ochranné pásmo pozemků určených k plnění funkce lesa. Respektovány jsou i zdroje nerostných surovin a horninové prostředí.

Výhradní ložisko vltavínonosné horniny 326180000 Slavče – Sever, chráněné ložisko 26180000 Slavče I, výhradní ložisko kamene 314240000 Dobrkovská Lhotka a stejnojmenný dobývací prostor č. 70810 jsou v dokumentaci vyznačeny a respektovány, stejně jako poddolované území starého důlního díla č. 2097 Slavče u Trhových Svinů.

Koncepce řešení technické infrastruktury předpokládá dořešení systému odvádění a čištění odpadních vod v jednotlivých částech obce.

Nejsou navrženy plochy pro využití k činnostem, které by mohly vést ke zhoršení kvality ovzduší ani plochy, kde by byly připuštěny činnosti zatěžující okolí nadlimitním hlukem.

Přestože se v obci nenachází žádné archeologické naleziště, ani lokalita archeologického zájmu, je potřeba na území obce pohlížet jako na území s archeologickými nálezy.

Registrované nemovité kulturní památky :

Dobrovská Lhotka – Číslo rejstříku 28898/3-421 – boží muka

Klebany – Číslo rejstříku 31155/3-253 – boží muka při cestě do Lniště

Lniště – Číslo rejstříku 21874/3-255 – boží muka směr Mohuřice

Lniště – Číslo rejstříku 22583/3-254 – boží muka při cestě do Břeží

Mohuřice – Číslo rejstříku 24410/3-257 – boží muka při silnici do Trhových Svinů

Mohuřice – Číslo rejstříku 39070/3-258 – boží muka při silnici do Trhových Svinů

Záluží – Číslo rejstříku 18573/-5299 – kaplička na návsi

Záluží – Číslo rejstříku 26162/3-424 – boží muka na návsi

Záluží – Číslo rejstříku 46747/3-425 – boží muka směr Slavče

Slavče – Číslo rejstříku 101134 – kostel. Sv. Filipa a Jakuba

Slavče – Číslo rejstříku 26037/3-423 – kaplička

- jsou v dokumentaci vyznačeny a obecně respektovány.

Za součást kulturně historického dědictví je pokládáno i uspořádání jednotlivých sídel v krajině a jejich půdorysná stopa. Z toho důvodu byla zvolena koncepce rozvojových ploch

navazujících na zastavěné území, což přispívá k šetrnému zacházení s krajinou s ohledem na zachování příznivého krajinného rámce, tradičního měřítka krajiny a kvalit předurčujících pohodu bydlení. Bydlení jako funkční složka bude i nadále tvořit dominantní využití zastavěného území a zastavitelných ploch v obci. Z demografické analýzy vyplývá nárůst obyvatelstva, který ale není způsoben přirozenou měnou, ale migrací do obce (počet přistěhovalých je jen za rok 2007 je 22). Stávající ÚPNSÚ Slavče již neposkytoval nabídku rozvojových ploch – jím navrhované nové plochy pro bydlení již jsou vyčerpány – ani (vzhledem k formě zpracování) intenzifikaci využití ploch v zastavěném území (intravilán).

Bylo tedy nově vymezeno množství zastavitelných ploch pro bydlení, definovaných jako plochy smíšené obytné – území malých sídel.

Přiměřený rozvoj je umožněn nejen ve vlastní Slavči, ale i v ostatních sídlech v administrativně – správním území.

Rozvojové (zastavitelné) plochy bez návaznosti na zastavěné území nebyly vymezeny, aby nedocházelo k nadměrné urbanizaci volné krajiny. Zachován a doplňován je urbanistický půdorys sídel, zachována je i potřebná míra kontinuity s dříve zpracovaným ÚPNSÚ Slavče.

Na základě vyhodnocení stanovisek a připomínek ze společného jednání o územním plánu byla pro zastavitelné plochy v lokalitách Lhotka A1, Lhotka C1 a Lhotka D1 předepsána územní studie.

Území obce bylo územním plánem rozčleněno na plochy s rozdílným způsobem využití ve smyslu vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. S ohledem na specifické podmínky a charakter řešeného území byly plochy s rozdílným způsobem využití dále podrobněji členěny, aby bylo možno důsledně uplatnit urbanistickou koncepci územního plánu, včetně ochrany a tvorby krajiny.

Charakter obce povede obyvatelstvo i nadále k využívání vyšší vybavenosti a služeb v nejbližších vyšších jednotkách osídlení, zejména v Trhových Svinech, nebyly proto navrženy monofunkční rozvojové plochy občanského vybavení.

Rozsah existujících chatových osad a zahrádek je považován za limitní, další rozvojové plochy pro chatové osady a zahrádky nejsou vymezeny. Předpokládá se polyfunkční využití ploch smíšených obytných – území malých sídel i pro rekreaci, cestovní ruch, přechodné ubytování a veřejné stravování, služby a drobnou nerušící výrobu.

Zastavitelné plochy pro výrobu jsou vymezeny v duchu koncepce založené ÚPNSÚ Slavče – tím je zachována kontinuita územně plánovací činnosti a obec získává rezervu pro případné posílení dosud slabé ekonomické základny.

V rámci ploch přestavby je umožněno využití i pro výrobu průmyslovou a skladování. Stávající areály zemědělské výroby jsou územním plánem respektovány, neboť zemědělství je v řešeném území stabilizovaným ekonomickým odvětvím.

Dopravní systém obce je doplněn o nová napojení zastavitelných ploch, obnoven je cestní systém ve volné krajině. Navržena je koncepce řešení technické infrastruktury, zejména doplnění inženýrských sítí v rámci vymezených zastavitelných ploch. V osadách, kde inženýrské sítě chybějí, je navrženo řešení tohoto deficitu.

d/ Informace o výsledcích vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území a o stanovisku k vyhodnocení vlivů na životní prostředí

Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území nebylo projektantem prováděno, zadání neobsahovalo požadavek na jeho zpracování (§ 50, odst. 1. zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění).

Dotčený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání neuplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí.

e/ Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF a PUPFL

vypracované podle přílohy č. 3 k vyhlášce MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu

V řešeném území se nachází půdy s těmito BPEJ:

I. třída ochrany zemědělské půdy (83401, 83421)

II. třída ochrany zemědělské půdy (73201, 73211, 83404, 83431)

III. třída ochrany zemědělské půdy (73204, 75001, 75011, 83424, 83434, 85001)

IV. třída ochrany zemědělské půdy (73214, 75014, 83441, 83451, 85011)

V. třída ochrany zemědělské půdy (73241, 73244, 73716, 74068, 75041, 75051, 76601, 76701, 76811, 76841, 76901, 77101, 83444, 83454, 83716, 84067, 86601, 86701, 86811, 86841, 87101, 87411)

Hlavní půdní jednotky vyskytující se v řešeném území jsou:

32 Kambizemě modální eubazické až mezobazické na hrubých zvětralinách, propustných, minerálně chudých substrátech, žulách, syenitech, granodioritech, méně ortorulách, středně těžké lehčí s vyšším obsahem grusu, vláhově příznivější ve vlhčím klimatu

34 Kambizemě dystické, kambizemě modální mezobazické i kryptopodzoly modální na žulách, rulách, svorech a fylitech, středně těžké lehčí až středně skeletovité, vláhově zásobené, vždy však v mírně chladném klimatickém regionu

37 Kambizemě litické, kambizemě modální, kambizemě rankerové a rankery modální na pevných substrátech bez rozlišení, v podorniči od 30 cm silně skeletovité nebo s pevnou horninou, slabě až středně skeletovité, v ornici středně těžké lehčí až lehké, převážně výsušné, závislé na srážkách

40 Půdy se sklonitostí vyšší než 12 stupňů, kambizemě, rendziny, pararendziny, rankery, regozemě, černozemě, hnědozemě a další, zrnitostně středně těžké lehčí až lehké, s různou skeletovitostí, vláhově závislé na klimatu a expozici

50 Kambizemě oglejené a pseudogleje modální na žulách, rulách a jiných pevných horninách (které nejsou v HPJ 48,49), středně těžké lehčí až středně těžké, slabě až středně skeletovité, se sklonem k dočasnému zamokření

66 Stagnogleje modální i histické na pískách, jílech, slínech a nivních uloženinách, lehké až velmi těžké s vyšším obsahem organických látek, velmi nepříznivý vodní režim, nevhodné pro jeho úpravu

67 Gleje modální na různých substrátech často vrstevnatě uložených, v polohách širokých depresí a rovinných celků, středně těžké až těžké, při vodních tocích závislé na výšce hladiny toku, zaplavované, těžko odvodnitelné

68 Gleje modální i modální zrašelinělé, gleje histické, černice glejové zrašelinělé na nivních uloženinách v okolí menších vodních toků, půdy úzkých depresí včetně svahů, obtížně vymežitelné, středně těžké až velmi těžké, nepříznivý vodní režim

69 Gleje akvické, gleje akvické zrašeliněné a gleje histické na nivních uloženinách nebo svahovinách, převážně těžké, výrazně zamokřené, půdy depresí a rovinných celků

71 Gleje fluvické, fluvizemě glejové, stejných vlastností jako HPJ 70, avšak výrazně vlhčí při terasových částech úzkých niv

74 Pseudogleje glejové i hydroeluvialní, gleje povrchové zrašelinělé i gleje povrchové histické, gleje akvické, stagnoglej modální, půdy středně těžké až velmi těžké, až středně skeletovité nacházející se ve svahových polohách, zamokřené se svahovými prameny, často zrašelinělé

e/1. Údaje o rozsahu požadovaných ploch a podílu půdy náležejícího do ZPF

Tab. č. 1: Lniště

Označení plochy	Kultura	BPEJ	Plocha (m ²)	Stupeň ochrany	Účel odejmutí
A ₁	Trvalý travní porost	75011	2 665	III.	Plochy smíšené obytné – území malých sídel
B ₁	Orná půda	75011	1 015	III.	Plochy smíšené obytné – území malých sídel
	Trvalý travní porost		1 928		
Celkem	5 608 m ² III. třídy				

Jedná se o rozvojové plochy malého rozsahu určené pro bydlení, které navazují na zastavěné území obce. Plochy záboru se nachází na půdách, které jsou zařazeny do III. třídy ochrany, jedná se tedy o půdy v daném klimatickém regionu s průměrnou produkční schopností a středním stupněm ochrany, které je možno v územním plánování využít pro eventuální výstavbu.

Tab. č. 2: Keblany

Označení plochy	kultura	BPEJ	Plocha (m ²)	Stupeň ochrany	Účel odejmutí
B ₁	Trvalý travní porost	76811	5 500	V.	Plochy smíšené obytné – území malých sídel
B ₂	Trvalý travní porost	76811 73241	3 670	V.	Plochy smíšené obytné – území malých sídel
B ₃	Trvalý travní porost	76811 73241	1 930	V.	Plochy smíšené obytné – území malých sídel
	Orná půda	73241	1 610		
C ₁	Trvalý travní porost	73211	614	II.	Plochy smíšené obytné – území malých sídel
	Orná půda	73211	1 342	II.	
		75001	1 382	III.	
D ₁	Trvalý travní porost	76811	1 541	V.	Plochy smíšené obytné – území malých sídel
	Orná půda	73201	1 090	II.	
		73241	7 210	V.	
		76811			
Celkem dle tříd			3 046	II.	
			1 382	III.	
			21 461	V.	
Celkem	25 889 m ²				

Navržená zástavba smíšená obytná navazuje na stávající zástavbu sídla, vhodně využívá proluky a je navržena na půdách převážně náležejících do V. třídy ochrany a na necelých 0,31 ha také na půdy náležející do II. třídy ochrany. Do II. třídy jsou situovány zemědělské půdy, které mají v rámci jednotlivých klimatických regionů nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochrany ZPF jde o půdy vysoce chráněné, jen podmíněně odnímatelné a s ohledem na územní plánování také jen podmíněně zastavitelné. V tomto případě se jedná o relativně malý zábor těchto kvalitních půd respektující další prvky ochrany ZPF.

Většina záborových ploch je navržena na plochách náležejících do V. třídy ochrany, kam jsou zařazeny půdy s velmi nízkou produkční schopností a lze u nich předpokládat efektivnější nezemědělské využití.

Tab. č. 3: Mohuřice

Označení	kultura	BPEJ	Plocha	Stupeň	Účel odejmutí
----------	---------	------	--------	--------	---------------

plochy			(m ²)	ochrany	
A ₁	Trvalý travní	73211	2 945	II.	Plochy smíšené obytné – území malých sídel
	porost		1 167		
	Orná půda				
B ₁	Orná půda	73211	7 160	II.	Plochy smíšené obytné – území malých sídel
B ₂	Orná půda	76901	1 055	V.	Plochy smíšené obytné – území malých sídel
		73211	576	II.	
C ₁	Trvalý travní porost	73241 76701	1 116	V.	Plochy smíšené obytné – území malých sídel
D ₁	Orná půda	73214	3 665	IV.	Plochy smíšené obytné – území malých sídel
E ₁	Orná půda	73214	3 305	IV.	Plochy smíšené obytné – území malých sídel
E ₂	Trvalý travní porost	75041	2 585	V.	Plochy vodní a vodohospodářské
Celkem dle tříd			11 848	II.	
			6 970	IV.	
			4 756	V.	
Celkem	23 574 m ²				

Zástavba smíšená obytná je zde navržena v návaznosti na zastavěné území, v těsné blízkosti stávající zástavby. Většinou se zde jedná o zábor půd náležejících do II. třídy ochrany tzn. půd s nadprůměrnou produkční schopností, které jsou odnímatelné pouze podmíněně. Zde se jedná o malou výměru záboru ZPF, kdy zástavbou dojde k trvalému záboru části pozemku pouze pod stavbou a zbývající část zůstane v kultuře zahrada součástí ZPF.

Dále jsou zde navrženy k zástavbě půdy V. třídy ochrany, které jsou pro zemědělské potřeby postradatelné. Plochy záboru vodní a vodohospodářské navíc mohou zůstat dle jejich účelu využití součástí ZPF.

Tab. č. 4: Slavče

Označení plochy	kultura	BPEJ	Plocha (m ²)	Stupeň ochrany	Účel odejmutí
A ₁	Orná půda	83401	1 557	I.	Plochy dopravní

					infrastruktury - hromadné a řadové garáže
B ₁	Trvalý travní porost	85001	1 075	III.	Plochy smíšené obytné – území malých sídel
B ₂	Orná půda	85011	812	IV.	Plochy technické infrastruktury
C ₁	Orná půda	85011	4 082	IV.	Plochy smíšené obytné – území malých sídel
D ₁	Trvalý travní porost	83421	5 100	I.	Plochy smíšené obytné – území malých sídel
		85011	120	IV.	
D ₂	Trvalý travní porost	83421	2 715	I.	Plochy smíšené obytné – území malých sídel
		85011	200	IV.	
D ₃	Trvalý travní porost	83421	5 100	I.	Plochy výroby a sklad. – průmysl a služby
E ₁	Trvalý travní porost	83421	5 820	I.	Plochy výroby a sklad. – průmysl a služby
F ₁	Trvalý travní porost	83421	8 250	I.	Plochy smíšené obytné – území malých sídel
		83401			
F ₂	Orná půda	83401	9 620	I.	Plochy smíšené obytné – území malých sídel
Celkem dle tříd			38 162	I.	
			1 075	III.	
			5 214	IV.	
Celkem	44 451 m ²				

Ve Slavči jsou navrženy k záboru zemědělské půdy převážně I. třídy ochrany, kam jsou zařazeny nejvyšší kvality půdy s nadprůměrnou produkční schopností. Největší plochy jsou určeny pro výrobní a skladové využití, v případě lokality D₃ se jedná o rozšíření stávajícího zemědělského areálu a o převedení zemědělské účelové dopravy mimo komunikační kostru uvnitř sídla, kdy není územně možný zábor zemědělských půd horší kvality. V případě lokality E₁ se jedná o nabídku ploch pro průmyslové využití. U obou těchto lokalit jde o zachování kontinuity územně plánovací činnosti, neboť s uvedenými rozvojovými plochami pro jmenované využití počítal už původní územní plán sídelního útvaru Slavče, včetně Změny číslo 1. Lokalita A₁ je vymezena pro zajištění parkování, odstavování a případně i pro garážování vozidel na příjezdu do obytného území, zaplňuje enklávu dosud nezastavěných ploch na jinak kompaktním okraji zastavěného území sídla Slavče.

Zábory určené pro smíšenou obytnou zástavbu jsou účelně navrženy v návaznosti na stávající zástavbu, nejedná se o územně velké plochy, ale o více menších ploch rozložených do všech částí sídla. Lokalita D₁ byla již součástí ÚPnSÚ Slavče, lokalita F₁ představuje logické doplnění urbanistického půdorysu sídla, navíc jsou zdejší pozemky převážně ve vlastnictví obce, což dává předpoklad relativně rychlého naplnění koncepce územního plánu, s ohledem na skutečnost, že rozvojové plochy pro bydlení, vymezené starým ÚPnSÚ Slavče, již byly prakticky vyčerpány. Lokalita F₂ uzavírá sídlo ze západu a zástavbou ukončuje komunikační a kompoziční osu obestavěnou v současnosti novostavbami rodinných domů.

Tab. č. 5: Záluží

Označení plochy	kultura	BPEJ	Plocha (m²)	Stupeň ochrany	Účel odejmutí
A ₁	Trvalý travní	83421	1 822	I.	Plochy smíšené obytné – území malých sídel
	porost		741		
	Orná půda				
Celkem	2 563 m² I. třídy				

Jedná se o malý zábor nejkvalitnější půdy I. třídy ochrany, který je určený pro smíšenou obytnou zástavbu a navazuje zastavěné území. Výstavbou dojde k záboru plochy pouze pod stavbou, zbytek zůstane součástí ZPF. Nejedná se o rozlohou významný zábor, rozvojová plocha A₁ vyplňuje proluku a kompaktně vymezuje hranici zástavby vzhledem k volné krajině.

Tab. č. 6: „Na Hrbech“

Označení plochy	kultura	BPEJ	Plocha (m²)	Stupeň ochrany	Účel odejmutí
A _I	Trvalý travní	84067	1 597	V.	Plochy smíšené obytné – území malých sídel
	porost	86841			
Celkem	1 597 m² V. třídy				

Jde o doplnění rozvojové plochy v návaznosti na zastavěné území v lokalitě. Z hlediska ochrany ZPF se jedná o postradatelné plochy.

Tab. č. 7: Lhotka

Označení plochy	Kultura	BPEJ	Plocha (m ²)	Stupeň ochrany	Účel odejmutí
A ₁	Trvalý travní	83434	12 270	III.	Plochy smíšené obytné –

	porost				území malých sídel
B ₁	Trvalý travní porost	83434	11 670	III.	Plochy smíšené obytné – území malých sídel
C ₁	Trvalý travní porost	83434	6 570	III.	Plochy smíšené obytné – území malých sídel
D ₁	Trvalý travní porost	83434	5 168	III.	Plochy smíšené obytné – území malých sídel
E ₁	Trvalý travní porost	83434	7 353	III.	Plochy smíšené obytné – území malých sídel
Celkem	43 031 m ² III. třída ochrany				

Rozvojové plochy pro smíšenou obytnou zástavbu jsou situované na půdách III. třídy ochrany, které lze vzhledem k jejich produkční schopnosti využít pro zástavbu. Všechny navržené zábory navazují na stávající zástavbu.

Tab. č. 8: Dobrkovská Lhotka

Označení plochy	Kultura	BPEJ	Plocha (m ²)	Stupeň ochrany	Účel odejmutí
A ₁	Orná půda	83434	4 525	III.	Plochy smíšené obytné – území malých sídel
B ₁	Trvalý travní porost	83454	2 290	V.	Plochy smíšené obytné – území malých sídel
Celkem	6 815 m ²				

Plochy pro smíšenou obytnou zástavbu jsou zde navrženy v návaznosti na zastavěné území a jedná se o půdy se střední a velmi nízkou produkční schopností.

e/2. Údaje o uskutečněných investicích do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti a o jejich předpokládaném porušení

V okolí Slavče jsou plochy záborů C₁, D₁, D₂ a částečně také D₃ umístěny na meliorovaných pozemcích. Při realizaci navrhovaného záboru dojde ke zrušení těchto meliorací. Vzhledem k velikosti záboru však nedojde k ovlivnění okolních melioračních ploch a k narušení funkčnosti zbylého melioračního zařízení. Před realizací samotných staveb musí být učiněna opatření, aby nedošlo k narušení hydrologických a odtokových poměrů na zbylých částech pozemků, které zůstanou součástí ZPF.

Ostatní navržené zábory v dalších sídlech nejsou situovány na meliorované pozemky.

e/3. Údaje o areálech a objektech staveb zemědělské prvovýroby a zemědělských usedlostech a o jejich předpokládaném porušení

Navrhovaným řešením nedojde k ovlivnění objektů zemědělské prvovýroby.

e/4. Údaje o uspořádání zemědělského půdního fondu v území, opatřeních k zajištění ekologické stability krajiny a významných skutečnostech vyplývajících ze schválených návrhů pozemkových úprav a o jejich předpokládaném porušení

V územním plánu Slavče jsou převzaty a vymezeny prvky ÚSES, které v plné míře návrh respektuje. Navrhovaným řešením nedojde k porušení uspořádání ZPF v území, k porušení ÚSES a zařízení převzatých z pozemkových úprav.

e/5. Zdůvodnění, proč je navrhované řešení ve srovnání s jiným možným řešením nejvýhodnější z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu a ostatních zákonem chráněných obecných zájmů.

Tab. č. 9 Celkové zábory v jednotlivých třídách ochrany zemědělských půd

Stupeň ochrany	Plocha (ha)
I.	4,0725
II.	1,4894
III.	5,5621
IV.	1,2184
V.	3,0104
Celkem	15,3528 ha

Tab. č. 10: Funkční využití ploch záboru ZPF

Funkční využití	Plocha ZPF (ha)
Plochy smíšené obytné – území malých sídel	13,7654
Plochy výrobní a sklad.- průmysl a služby	1,092
Plochy vodní a vodohospodářské	0,2585
Plochy technické infrastruktury	0,0812
Plochy dopravní infrastruktury	0,1557

Celkem je Územním plánem Slavče navrženo k odejmutí ze ZPF 15,35 ha půdy, z toho cca více než třetina, tedy 5,56 ha patří v daném klimatickém regionu mezi bonitně nejceněnější půdy, které lze ze ZPF odejmout pouze výjimečně či podmíněně. Zbytek tvoří půdy s průměrnými až podprůměrnými produkčními schopnostmi. Celkový rozsah navrženého záboru je na velikost daného území přiměřený. Podrobné zdůvodnění záboru je uvedeno pod tabulkami vztahujícími se k jednotlivým sídlům.

Navrhované řešení respektuje principy ochrany ZPF, nenarušuje organizaci ZPF, ani síť zemědělských účelových komunikací. Hydrologické a odtokové poměry ovlivňuje minimálně a pouze lokálně, při respektování obecně platných i konkrétních opatření při realizaci jednotlivých záměrů bude možné tyto vlivy ještě minimalizovat.

U záborů v jednotlivých sídlech jsou uvedeny konkrétní důvody, proč je konkrétní navrhované řešení z hlediska ochrany ZPF nejvýhodnější při současném respektování urbanistických zásad a potřeb rozvoje území. Zastavitelné plochy bez návaznosti na zastavitelné území nebyly vymezeny, aby nedocházelo k nadměrné urbanizaci krajiny a záborům ZPF. Navržené plochy pro bydlení respektují zachování a doplnění urbanistického půdorysu sídel. V návrhu jsou respektována hlediska potřeb výměry jednotlivých rozvojových ploch, charakter jednotlivých sídel, využití pozemků navazujících na stávající zástavbu, využití stavebních proluk atd. V případech, kdy je navržena k záboru v daném klimatickém regionu nejceněnější půda, bylo zvoleno z hlediska dalších zájmů ochrany ZPF co nejvýhodnější řešení. V případě záboru půdy I. třídy ochrany pro výrobní činnosti v sídle Slavče navazují tyto plochy na stávající výrobní plochy a jsou jedinou územní možností jejich rozvoje. Zohledněna byla i návaznost na starý ÚPnSÚ Slavče, včetně Změny číslo 1.

Při návrhu byly vždy brány v úvahu zásady ochrany ZPF definované zákonem č. 334/1992 Sb. o ochraně ZPF, a to především:

- pro nezemědělské účely využívat nezemědělskou půdu, zejména nezastavěné a nedostatečně využitě pozemky v zastavěném území nebo na nezastavěných plochách stavebních pozemků, staveb mimo toto území, stavební proluky a plochy získané zbořením přežilých budov a zařízení,
- záborem pozemků ZPF narušovat co nejméně organizaci zemědělského půdního fondu, hydrologické a odtokové poměry v území a síť zemědělských účelových komunikací,
- k záboru navrhopvat jen nejnutnější plochu ZPF.

Návrh Územního plánu Slavče představuje z hlediska ochrany ZPF s respektováním potřeb rozvoje území obce to nejvýhodnější řešení.

Tab. č. 11: Porovnání navržených rozvojových ploch a ploch záboru ZPF

Zastavitelné plochy celkem	16,5345 ha
Plochy přestavby	11,0465 ha
Zábor celkem	27,581 ha
Z toho celkový zábor ZPF	15,3528 ha
Z toho zábor ostatních ploch	1,1817 ha
Z toho zábor přestavby	11,0465 ha